(لمؤلفه)

دكتور

نجيب اسعد

(أخصائى الرئتين)

من مستشفيات باريس وامستراميوردج وفينا

عضو مصر فى مؤتمر الاتحاد الدولى للسل

وعضو الجمعية المصرية لمكافحة الدرن

(لمؤلفه)
دكتور
نجيب اسبعد

(أخصائى الرئتين)
من مستشفيات باريس وإسترا سبورج وفينا
عضو مصر فى مؤتمر الاتحاد الدولى للسل
وعضو الجمعية المصرية لمكافحة الدرن

اكتشافات المؤلف :

(١) اكتشاف القوس الظفرى الفاتح اللون كعلامة أولية لسموم ميكروبات الدرن فى الاظافر تظهر قبل ظهور السعال والبصاق بزمن طويل أذيعت على هيئة المؤتمر الطبى للجمعية المصرية الطبية سنة ١٩٢٣ (انظر الجزء الثانى)

(٢) اكتشاف علاقة الاستعداد الشخصى للسل بمرض الزهرى الوراثى وقد أذاعها المؤلف على هيئة المؤتمر التاسع للاتحاد الدولى لمكافحة السل فى عاصمة بولندا سنة ١٩٣٤ وقد نشرت فى المجلة الطبية المصرية .

(٣) اكتشاف علاج الفاروقين للسل الرئوى وقد نجح هـــذا العلاج فى شفاء المرض فى أول ادواره وقد القيت محاضرة خاصة بشأنه فى الجمعية الطبية المصرية ونشرت فى مجلتها سنة ١٩٣٧ ويأمل المؤلف انه مع ادخال تحسينات على هذا العـــلاج أن يأتى بنتائج حسنه فى الحـالات المتقدمة كما اعطى فى اوائلها .

(٤) النزلة الشعبية الرلالية الحـادة

(٥) الاعـراض الاحتقانية المركبات الحديدية على الرئتين وقـــد القيت على الجمعيـة المصرية لمكافحة الدرن

حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم

مشجع العلم والعرفان . الساهر على خير رعيته . العامل على أسعادها . الذى ضحى بأيام عيد ميلاده السعيد ليشرف بنفسه على مكافحة المرض والجوع فى أطراف الصعيد ، ولايق البلاد من أخطار الملاريا الخبيثة ووباء بعوضها الشديد . فعرض ذاته الكريمة للعدوى ليجنب البلاد والعباد اخطار وشر العدوى وكان أكبر عون للاطباء والممرضات ومبرة محمد على للمضى فى رسالتهم الانسانية بعزيمة من حديد ولتأدية واجبهم العلاجى والوقائى على أكمل وجه حميد ـ فحق لنا أن نهتف له من أعماق قلوبنا له بطول العمر المديد السعيد :ـ

سرت يوم العيد تأسو أمة ... فى صعيد لطف الله أساها

تلمس الداء فتشفى علة ... بيد تحمل للمرضى شفاها

تنقل البشرى الى القلب كما ... تنقل العين الى النفس مناها

عش لوادى النيل يارب الحمى ... قبلة يرنو اليها من رآها

من قصيدة للاستاذ الشاعر بولس غانم

الإهداء

إلى العالم الكبير وأستاذ الطب المنير الذى رفع علمه وهو من أعلامه ودرسه فى كلية الطب أكثر من أربعين عاماً فزخر العلم ببحره وتخرج على يديه مئات الأطباء ممن يشار اليهم بالبنان ويشيدون بفخره ، ويدينون بفضله ، وولى عمادة الكلية ووكالة الجامعة فرفع لوامها عاليا بين كليات العالم أجمع . وما أسند اليه المليك المعظم شؤون وزارة الصحة الا لقدرته على العمل الناضج المثمر لمحاربة المرض .

وأنى لاهدى إلى استاذى هذا الكتاب الذى هو ثمرة الجهود والغيرة على الصالح العام اعترافا بفضله على وعلى الطب والأطباء قاطبة وفقنا الله لما فيه خير البلاد فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم .

صورة العالم الكبير صاحب المعالي
الدكتور سليمان باشا حزمي
وزير الصحة

مقدمة

انتشرت فى انحاء البلاد أعمال الاصلاح والبر التى تنفذها الحكومة المصرية بأرشاد حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم الذى امتازعهده السعيد بما تراه العين من بوادر التحسينات والاصلاح فى شتى مرافق البلاد ولا غرو ان تنشط هذه النهضة المباركة مادام يرعى شؤونها ملك كريم ساهر على خير رعيته عامل على اسعادها وترقية حالة ابنائها .

ولما كان يتحتم على كل فرد من افراد هذه الأمة الكريمة أن يساهم بنصيبه فى هذه الحركة بقدر ما تسمح له مؤهلاته وظروفه .

ولما كثرت الآفات الصدرية وتفشت اصاباتها فى القطر حتى زادت على عشرات الألوف سنويا ، اصبح لزاما على أن امد يدى فأنشر على الجمهور ما وصل اليه العلم الحديث وابحاث أئمة الطب الذين اشتركت معهم فى المؤتمرات الدولية فى القارة الاوربية ما يكون عونا له لاتقاء شر هذه الأمراض ولعلى إذ أنشر هذا المؤلف الذى يجمع بين دفتيه ما استطعته فى هذا السبيل اكون موفقا فى خدمة مواطنى الكرام ...

نظره عامـــه

قد يتبادر الى الذهن عند التأمل فى حسن مناخ مصر وانها تتمتع بقسط وافر من اشعة الشمس على مدار السنة ان هـذا المرض لا يجد مرعى صالحاً لنموه بين ظهرانينا وان اصاباته قليلة فيه بالنسبة لغيره من الاقطار ولـكن التطلع للارقام السالفة الذكر يدهشنا ويدلنا على مبلغ الحقيقة المؤلمة وهى كثرة ضحاياه . تعمل على ذلك عوامل كثيرة منها الرطوبة المنتشرة هنا وهناك باعتباره بلداً زراعياً تروى أراضيه فى اغلب اوقات السنه .

ومنها التقلبات الجويه التى يكابدها القطر ويتعرض لها لانبساط اراضيه وهبوب الرياح الساخنه والباردة على التعاقب فى اكثر الأحايين وهذا ما يضعف مقاومة الاجسام . وزيادة على ذلك فهناك عوامل اخرى وهى ما تسمى بالأستعدادات الشخصيه وقد حللنا تحليلا علميا فى ابحاث القيناها على هيئه المؤتمر التاسع للاتحاد الدولى ضد السل الذى انعقد فى مدينة وارسو عاصمة بولونيا سنة ١٩٣٤ . وسنعود لذكرها تفصيلا فيما بعد .

المسكن زد على ذلك سوء حالة المسكن وافتقاره للضوء واشعة الشمس وهذا راجع لازدحام الازقة والشوارع بالبيوت وتلاصقها بعضها ببعض الشىء الذى يجب ان يوضع له تشريع خاص تتكفل بتنفيذه مصلحة التنظيم واشراف وزارة الصحة .

النوسم واسراعه مع مدنيتنا الحاضرة

اذا بحثنا عن طريقة انتشار هذا المرض فاننا نجد ان العدوى وحدها ليست كافية لانتشاره وان العامل الذى يمهد لسريان العدوى هو انكباب الطبقة العاملة على العمل دون تحديد ساعاته

بخلاف الحال فى أوربا فمثلا باعة المأكولات والخضر واللحوم والبقالة والصيادلة وباعة السجاير مقيدين بغلق محلاتهم فى الساعة السابعة مساء فاذا ما خالف احدهم اللائحة جوزى وبذلك يتمكن موظفو هذه المحلات من الراحة الكافية ويأمنون شر مرض السل الذى يأتى غالباً من الاجهاد والسهر وعدم النوم الكافى . أما هنا فانى أعجب اذ أذكر ان بعض موظفى بعض المصالح لا يزالون يعملون ١٢ أو ١٤ ساعة يوميا بدون انقطاع

ان أهم مجدد للقوى وواق من المرض هو النوم الكافى فى جو مشبع بكهربائية الشمس أى ان تكون غرفة النوم دخلتها أشعة الشمس نحواً من ٣ ساعات فى اثناء النهار واذا واظب على ذلك أى انسان ووضع نصب عينيه اعطاء جسمه نصيبا من الراحة كلما احس بالتعب فلا أعتقد أبداً انه يكون عرضة لهذا المرض يوما ما

الاشعة الضوئية وتقوية الجسم عامة والصدر خاصة

ويهمنا استيعاب الجديد عما له علاقة بالصحة العامة وكيف يمكن ان تكون الاشعة الضوئيه واقية للجسم من الامراض والى اى مدى تتمشى مع المناعة الحيوية الاشعة فمن الابحاث التى طرحت على مؤتمر الدانمرك وكان لى شرف الاشتراك فى اعماله ما سبق تقريره فى مؤتمر باريس الدولى للاشعة فى سنة ١٩٢٩ من ان لتوفر هذه المناعة المكتسبة بالتعرض للاشعة يجب تحاشى اسوداد البشرة كلية . ولهذا السبب اعتبر علماء الاشعة وخاصة المشتغلون فى المصحات المنتشرة فى جبال سويسرا انحجاب اشعة الشمس بين حين وآخر وراء السحاب رحمة ربانية للمرضى الذين هم فى شدة الاحتياج لموجات الاشعة فوق البنفسجية الموجودة بكثرة فى ذلك العلو لئلا تتعود بشرتهم عليها فيضيع الغرض المقصود . اكثر من ذلك ان وجود الغمام الابيض فى السماء

وانعكاس اشعة الشمس عليه يزيد الضياء قوة فى الاشعة فوق البنفسجية .

ومن الامراض الهامة التى اتجهت انظار العالم لاستعمال الأشعة للوقاية منها مرض الاطفال ولين العظام وما يتبع الاخير من مضاعفات شعبية لكثيرة الانتشار فى القطر المصرى وقد اصبح من المعتقد مع تقدم الابحاث انه اذا عرض كل رضيع بضع مرات لاشعة فوق البنفسجيه فان مرض لين العظام يزول من الوجود وبذلك تعدم اهم سبب من اسباب كثرة وفيات الاطفال وفى هذا الطريق تسابقت الدول فى تأسيس المنشئات ذات الاشعة للوقاية ضد هذه الامراض خاصة ولغيرها عامة . فشاهدنا فى عواصم اوربا مستوصفات ضوئية كبيرة لعامة الجمهور مجهزة باجهزة قويها تبلغ العشرة آلاف كيلووات ومرتب بناؤها ترتيبا مخصوصا بحيث ان المرضى يدخلون من احدى نهايات البناء ويشون عراة الاجسام بين صفين من مصابيح هذه الاشعة لمسافات معينة يقدرها الطبيب المختص ثم يخرجون من النهاية الاخرى وقد اكتسبت اجسامهم وفى اسرع وقت جرعة واقية من الاشعة ضد الامراض المذكورة والنزلات الشعبية والزكام وكثير من الأمراض التى تنتج غالبا عن ضعف المقاومة الصورية .

وبحث المؤتمر فأقر الفكرة التى ترمى اليها لجان مكافحة الامراض فى فرنسا من انشاء مراكز وقائية مجهزة بالاشعة بحيث تكون قريبة من المدارس واحياء العمال حتى اذا اصبح احد الاطباء فترسل الاطفال بعربات معدة لهذا الغرض لاقرب مركزمنها وفى وقت فراغهم المدرسى ليأخذوا جرعات واقية من هذه الاشعة الكيماوية . أما اذا كان بينهم مرضى بغدد خنازيرية أو سل الجلد أو العظام فتباشر علاجهم هذه المراكز بنظام يعينه طبيبها المختص وتصرف للمعوزين منهم الغذاء الكافى طول مدة العلاج .

وهذه الطريقة تغنى عن « المصحات الوقائية » وكذا السولاريوم

التى يراها الرائح والغادى على سواحل الدانمرك الشرقيه والتى شاهدنا مثلها بكثرة فى السواحل الممتدة الى الشمال من نابولى ولشد ماكان اعجابى بالاستاذ موريلى ولاعجب اذا كان دائم السعى وراء التجديد فى العلاج الضوئى فى مصحة روما فهو احد تلاميذ العلامة فورنالينى الايطالى المشهور مكتشف عملية الاسترواح الصدرى لعلاج السل الرئوى .

وقد دل البحث على أن تأثير الاشعة تحت الحمراء وهى المتولدة من كل جسم ساخن والتى تكثر فى الضوء الشمسى لا سيما فى الاوقات الحارة وفى وسط النهار تحدث تفاعلا مصحوبا بحمى فى الغيران البيضاء المصابة بالدرن عند تعرضها لها بينما أن الاشعة فوق البنفسجية لا تسبب لها أى حمى ومن ذلك يفهم الضرر الكبير الذى يتعرض له المرضى أو نخفاء البنية من وجودهم فى أشعة الشمس القوية وخصوصا فى البلاد الحارة حيث تكون نسبه هـذه الاشعة فى الضوء الشمسى مرتفعة جدا .

وزيادة على ذلك فقد اثبات الابحاث أن الاشعة المفيدة تتناقض تماما مع الاشعة تحت الحمراء ذات الحرارة بمعنى انها تفقد فائدتها متى تعرض الجسم للاثنين معا . ولذلك يتضح لنا كيف أن سكان خط الاستواء حيث يعيشون عراة الاجسام هم أكثر عرضة للامراض ويموتون بغاية السرعة اذا انتابتهم اية عدوى وكذلك الاوربيون الذين يعيشون فى تلك الجهات لان المناعة وقوة المقاومة التى تكسبها الاشعة فوق البنفسجية للجسم فى هذه المناطق معدومة تقريبا .

الجزء الاول

الزكام

التهاب الغشاء الأنفي على نوعين أما ان يكون جافاً فيسمى بالزكام أو ان يصحبه رد فعل فيسيل من الأنف سائل مائي مع أحمرار في العينين وألم في الرأس وتسمى بالرشح . وكلا النوعين معدي وقد يتسرب الالتهاب فيما الى انحاء الهوائيه فيحدث نزله شعبية حاده

وكثيرا ما يتسبب الزكام بأحتقان في الزور أو أحساس غريب فيه فأذا استعملت غرغرة الليمون المركز أو مس بمحلول نترات الفضه من ٢ ٪ — ٦ ٪ لوقف الالتهاب قبل امتداده للانف وحصول الزكام وقد جرب الاطباء هذه المسه الوقائيه مع مرضاهم فكانت دائما ناجحة في منع الرشح والزكام .

وللزكام أو الرشح اهمية كبرى لأنه كثير المضاعفات : فمن مضاعفاته التهاب الاذن الوسطى وتأثر السمع أذا ازمن فيها الالتهاب أو تكرر حصوله أو انخرقت طبلة الأذن ومنها حصول التهاب حاد في جيوب الأذن وحصول صديد فيها قد يؤدي الى عمل عملية خطيره

ومن مضاعفاته الكثيرة التهاب الجيوب الأنفية وخصوصا الجيب الحدي المجاور للعين وقد شاهدت في مريضه التهابا في عصب العين الذي اثبتت الاشعه بر انه مسبب عن التهاب في جيب الانف المجاور للخد وكان ان عولج هذا الالتهاب فتحسن الابصار

ويكفي ان نقول ان معظم أفات السمع وضعفه نتيجة امتداد الالتهاب من الأنف الى الاذن حيث يوجد قناه صغيره موصله بين الاذنين .

لذلك يجب العناية بالابتعاد عن الزكام ما امكن وعلاجه على الوجه الاكمل بالاعتكاف برما امر



من هذه الصورة الجيوب الانفيه وقربها من المخ وتعرض الاخير لسريان الصديد فى حالة التهاب الجيوب الصديدى كذلك تبين القناة الموصله بين الانف والاذن

اكثر لايقافه بتناول السوائل الدافئة وأخذ رجلين من الاسبرين عند النوم مع كوبة من عصير الليمون اذه الساخنة ويستحسن عمل حمام ساخن للقدمين .

وقد وجدت ان تنقيط محلول الايفدرين والاجيرول المخففين فى الانف هو أحسن علاج للرشح فأذا لم يتحسن المريض بسرعة اعطى البرشام الآتى :

سترات الكافين ١٠ ر .
جلسروفسفات الجير ٥٠ ر .
بروميدرات الكينين ١٠ ر .
خلاصه الجوز المقيء ٠٢ ر .

ولنعلم بان الزكام اذا طال مع أى شخص دليل عن ضعف المقاومة ونقص الجير فى الجسم ولذلك يجب اعطاء حقن الجير فى الوريد أذا تجاوز الزكام اسبوعاً مع الوصفة الآنفة الذكر .

ومن السهل ان يعاود الشخص الزكام بعد شفائه أذا استعمل منديله الملوث أو اشياء أخرى من فوطة الوجه أو ملاية السرير وعلى ذلك يستحسن غسل هـــذه الاشيـاء بالمياه الساخنة بعد انتهاء الزكام والاكان صاحبها عرضة لأن يراجعه مرة أخرى .

النزله الشعبيه البسيطه

اذا اصيب الانسان بزكام او رشح من الانف وطال معه بسبب كثرة تعرضه للبرد او عدم الاعتكاف فانه هذا الالتهاب الموضعى يتشرب الى القصبة الهوائيه وشعبها وعندئذ يسمى بالنزلة الشعبيه وأعراض النزله السعال الجاف فى أول الامر ثم يتحول الى سعال مصحوب بالبلغم وفى معظم الأحيان يصحب السعال بعض صفير فى التنفس خصوصا فى الشهيق .

وبالكشف بالسماع يسمع الطبيب علامات الصفير الدالة على أصابة الشعب : وهذا الصفير يجب سماعه فى الشعب اليسرى واليمنى على السواء الا فى بعض الاحيان يكون مسموعاً فى جزء محلى لا يتغير من الصدر وفى هذه الحاله فقط يجب العناية وفحص المريض بالاشعة حيث يختفى وراء هذه الاصوات المحليه (١) اما غدد درن كامنه أو (٢) تليف درنى فى الرئه أو (٣) خراج رئوى

ولهذه الحالات الثلاث من الاهمية ما يحتم على الطبيب سرعة تشخيصها وعلاجها حيث تتوقف عليها حياة المريض

فاذا فات على الطبيب تشخيصها فاعطى المريض المركبات المنفثة للبلغم مثـــل مركبات البود أو اليودور والأفدرين فسرعان ما تتكمش على المريض هذه الغدد ويتسرب المرض الى باقى أجزاء الرئه أو الرئه الأخرى . أما أذا اعطى العلاج الجيرى والحقن الضروريه مثل حقن الكولين أو مركبات الجايا كول واليودوفورم الجومنيول فسرعان ما تتحسن الحاله وتختفى العلامات بالمسماع وبعد ذلك يجب وضع المريض فى حاله صحية جيده بعيداً عن الأجهاد والتعب مع استمراره على مركبات الجير أو مستحلب زيت السمك الجيرى

وفى هذه الكلمه تحذير لمن يتعاطى منفثات البلغم دون الالتجاء لطبيب مختبر

وأحسن علاج للنزله الشعبيه الحاده . السوائل الساخنه والتدفئة ووضع المطهرات فى الأنف ووضع مرهم الفيكس على الظهر والصدر واخذ الليمونادة الدافئه فأذا لم تتحسن فيجب الالتجاء الى الطبيب ليصف له منفثات البلغم البسيطه مثل صبغة البوليجالا ومركبات الجاوا . أما اذا كان السعال متعبا وجافا فيحسن اعطاء المريض بعض المسكنات مثل مركبات ديوبروكاردين تيفا التى تحتوى على مسكنات الكودين مع الكافور

النزلة الشعبية الزلالية

قد يبتدىء الزلال الكلوى أو الالتهاب الكلوى بمعنى آخر يعارض السعال فقط فتبتدىء شكوى المريض من السعال المزعج الذى يأتى بشكل نوبات تقلصية فى عضلات الشعب ويشعر المريض عندئذ بعلامات الاختناق أو احتباس النفس ولا تنفع فى هـــذه النزلة الشعبية سائر المسكنات المدونة فى الطب أو المنفثات المبلغم على الاطلاق ويضطر المريض للجلوس طول الليل لأنه يعجز الاستلقاء على الجانب أو الظهر تعاوده نوبة السعال من جديد .

وهذا المرض يجوز حصوله فى الشتاء أو الصيف على السواء وقـــد يصحبه علامات النزلة الشعبية العادية أو لا يصحبه أى علامة منها ويفحص المريض بالأشعة لا يعثر الطبيب المعالج على أى تغيير فى ظل الرئة أو صرتها أو ظل الشعب ولهذا يتبادر لذهن الطبيب بأن السعال نتيجة التهاب فى الحلق أو الزور فيحيله على أطباء الحنجره للمعالجة بالمس أو كما يترائى لهم بدون جدوى

وإذا فحص بول المريض لوجد به كمية كبيرة من الزلال (لذلك يجب فحص بول كل مريض قبل الكشف عليه) .

العلاج : يجب وضع المريض على سكر اللبن والسوائل المحلاة بسكر اللبن واليمون الحلو وكذا البرتقال السكرى وأحسن علاج هو حقن الجلوكوز المركز ٥٠ ٪ أو ٢٥ ٪ فى الوريد يوميا مع تدفئة الكليتين بجزام من الصوف ووصف برشام يحتوى على :—

لبنات الجير		٠٫٣٠
تيوبرومين		٠٫٣٥
سترات الصودا		٠٫٥٠

كربونات الصودا } ٠٫١٥
« الليثيوم }

يؤخذ مرتين يوميا وقد يستعان ببعض المسكنات الناجمة مثل ديوبركاردين تبقا بمقدار ٢٥ نقطة عند اللزوم مع الماء ، مع الحجامة الجافة أو الرطبة على الكليتين وتكرر حتى يشفى المريض تماما.

والوقاية : هو وقاية الجسم من البرد القارس الذى يؤثر على الكليتين فتصاب بالتهاب من نتائجه حصول ارتشاح فى النشاء المخاطى للشعب وهذا يثير السعال فى المريض قبل أن يلحظ على نفسه أى تغيير آخر مثل تورم الجفون او القدمين .

تمدد الشعب

تصاب الشعب من النزلات الشعبيه المتكرره بانساع قطرها وفى بعض الاحيان تتسع لدرجة التكيس فيتراكم فيها الافراز الصديدى لدرجة ان تنغص على المريض حياته فهو مقلق للغاية ليلا أو فى أول النهار أذ يستمر المريض فى السعال حتى يفرغ ما يتراكم فى هذه الشعب من الافراز وكثيرا ما يكون هذا الصديد مصحوباً برائحة كريهة مع التنفس أو البصاق يمج منها المجاور له . وهذا المرض صعب الشفاء ولذلك عد من الأمراض المستعصيه

والتشخيص بصعب العثور على هذا الاتساعات بواسطة الاشعه X الا اذا حقن المريض داخل الشعب بمادة معتمة للاشعة مثل مادة اليود الزيتية ليبيودول وبهذه الطريقة فقط يمكن تشخيص المرض سيما فى أول درجاته وبذلك يمكن ملافاة المرض قبل استفحاله .

والوقاية من هذا المرض

اولا — يجب عدم التهاون فى علاج النزلات الشعبية أو الالتهاب الشعبي الرئوى فى

الأطفال سيما بعد الحصبة أو الأنفلونزا او السعال الديكى واعطاء المريض عناية قصوى فى دور النقاهه لان ترك المريض يسعل وعدم علاجه علاجاً قاطعاً يساعد على تمدد واتساع الشعب وهذه بدورها مع تراكم الافرار تعمل على ضعف حوائط الشعب فتتسع أكثر فأكثر

ثانيا : الاهتمام بعلاج التهابات الانف أو الجيوب الانفية لأن ترك الالتهاب فى المسالك الهوائية العليا يساعد على وجود نزلة شعبية مزمنة وهذه بدورها تعمل على اضعاف حوائط الشعب واتساع قطرها .

ثالثا . يجب الابتعاد عن التدخين والسهر عند وجود نزلة شعبية بسيطه لان هذا يساعد على أزمانها فلهذا يجب الاعتكاف فى المنزل مع ترك التدخين . بضعة ايام حتى تساعد الطبيعة على شفاء الالتهاب وامتصاص افرازاته أولا بأول .

رابعا : أذا طال السعال فى النزلة الشعبية البسيطة عن اسبوعين فيجب مساعدة المريض بعمل حقن الفاكسين وهو عبارة عن ميكروبات مزروعة من بصاق عدة مرضى بالنزلة الشعبية ومعبأة فى انابيب مدرج فيهـــا قيمة الميكروبات فيحقن المريض مثلا بخمس وعشرين مليونا ثم يدرج حتى يصل الى ٢٠٠ مليون أو اكثر . وهذه الميكروبات ميتة ومنقاه من سمومها كما فى حقن فاكسن ماركة سيد Cepède أو Defour ولما كانت الميكروبات مأخوذة من مثل هذه الامراض فهى غالبة سريعة الشفاء عاجلة التأثير على تقصير دور المرض .

السعال الديكى

من مميزات هذا السعال أن يأخذ شكل نوبات طويلة تنتهى بصوت مثل صياح الديك وتزعج الطفل ومن حوله وفى اكثر الأحيان تنتهى بالقىء وهو يكثر بين الاطفال وقد تنقل العدوى

للأم مثلا أو للأب من أبنه . والمرض جرثومة خاصة تسمى (برتوساس)

وهى جرثومة ضعيفة يمكن مقاومتها بتقوية الأطفال بفيتامين (د) أو بزيت كبد الحوت أو بتعريض الاطفال للأشعة فوق البنفسجية التى لها تأثير ساحر فى شفاء الاطفال من هذا المرض أذ بنقل المريض لتبديل الهواء بجانب البحار حيث تكثر الاشعة الكيماوية آنفة الذكر سريعا ما يزول منه أعراض السعال المتعب والقىء المتكرر .

وللثلاثة العوامل المذكورة تأثير وقائى على الاطفال كما لها التأثير الشفائى الموضح آنفا .

ويمكن بطريقة الاستاذ براد فورد وزملائه الموضحة بعدد المجلة الطبية للجمعية الامريكية ٨٨٣ / ١٢٠ / لسنة ١٩٤٢ العثور على الميكروب بطريقة سهلة فى حلق مخالطى الاطفال وكذلك فى حلق المسعى (بحاملى الميكروب) وهؤلاء هم الذين ينشرون العدوى بين التلاميذ فى المدارس وبين من يختاط بهم . فالعثور عليهم بالطريقة المذكورة يمكن مفتش الصحة أو طبيب المدرسة من استئصال شأفة العدوى فى المدرسة ووقاية باقى التلاميذ بعمل حقن (الفاكسين) الخاص تحضير معامل بارك دافيس أو ما أشبه وهى ذات تأثير وقائى ناجح قلما تفشل فى درء المرض عن الاطفال المخالطين ولو أنها قد تفشل فى علاج بعض الاطفال من هذا المرض .

تضخم الغدة التيموسيه

عند ما يولد الطفل تكون هذه الغدة ظاهرة وكبيرة فى أعلى القفص الصدرى اذا كشف عليه بالأشعة ومع تقدم الطفل فى النمو والكبر تصغر هذه الغدة حتى تختفى فاذا لم تختف هذه الغدة لسبب غير معروف ولازمت الطفل فأنها تسبب أعراضا منها ضيق النفس عند الأطفال وكثيرا ما تسبب لهم بعض السعال وتعرض حياتهم للخطر من الوفاة الفجائية إذا اما أصابت احدهم صدمة من

الخلف أو الامام أو أثناء الركض أو الالعاب الرياضية وقد سمعنا بحوادث كثيرة من هذا القبيل .



صورة الدودة كما تظهر بالأشعة وقد التقط وراءها على القصبة الهوائية أسفل القلب

الوقاية من خطرها يجب الكشف بالأشعة على التلاميذ الصغار عند ملاحظة بعض النهجان واللهثة عند أقل مجهود جسماني أو من الألعاب الرياضية حتى اذا ظهرت بالأشعة وهي تشغل الفراغ أعلى القلب فى التجويف الصدرى يعالج هذا الطفل بالأشعة القوية x فتصغر وتنكمش بعد بضعة جلسات .

الورم الرئوى الديدانى

هذا الورم الرئوى عبارة عن كيس دودى وهو جزء من دورة الحياة للدودة الايكونوكيه الشريطية يبلغ طولها ٤ / ٥ ملليمترات تعيش فى امعاء الكلاب . وفى حالات نادرة فى أمعاء القطط ولهذا كانت بويضاتها تخرج فى براز هذين الحيوانين اللذين من عادتهما أن يلعقا بلسانهما دبرهما حيث توجد فى أكثر الاحيان بعض البويضات التى تعلق فى اللسان ، فاذا لامس الكلب يد صاحبه لوثها بالعدوى وعرض صاحبها للاصابة بما يسمى الكيس الرئوى الديدانى . وهذا المرض يصيب الرئة كما يصيب باقى الأعضاء وهو فى الذكور أكثر منه فى الأناث . يصيب الرعيان والقصابين والحراس وأصحاب الكلاب بكافة انواعها . وكثيرا ما تحدث الاصابة اذ يشرب

هؤلاء فى آنية أو يأكلون خضارا نيئا لوثها الكلب ببرازه .

وفى اعراضه يشبه هذا المرض من عدة وجوه السل الرئوى اذ يكثر النزيف الدموى من ونت لآخر مع السعال والالم البلورا وى ، كما يبتدىء فى اكثر الاحايين بالارتشاح السائل البلورا وى .

والخطورة هذا المرض والحض على اتقاء شره نص الدين الاســلامى على نجاسة الكلاب وأشار بالابتعاد عنها وقــد نهى المذهب الحنبلى بالابتعاد حتى عن ظلها وقال بأنه ينقض وضوء الصلاة . وأن فى هذه الحكمة العالية خير سبيل للوقاية من هذا المرض بالابتعاد عن ملامسة هذا الحيوان ومصاحبته واذا تعذر الابتعاد عن هذه العادة فيجب أولا — عدم تغذية الحيوان بلحم الضأن أو المعز النيء . ثانيا — يجب أن يكون غــذاء الكلب لحوما مسواة على النار أو لبنا أو مستحضرات الألبان . وثالثا — يجب تحليل برازه من وقت لآخر وفى هذا ، السبيل القويم لدرء خطر الحيوان عن صاحبه .

اخذ هــذا الشخص يداعب كلبه ويرى الكلب وهو يلعق باسانه خد صاحبه مع ما فيها من خطر العدوى بالكيس الهيدانى الرئوى



(صورة مجموعة المؤلف)

كيس ديداني في الرئة اليسرى لاحد الاعيان المزارعين بجوار القاهرة وقد ابتدأت اعراض المرض بنزيف من الصدر مع ألم وسعال وبعد أن تمكن المريض من مبارحة فراشه اخذت له الصوره فاظهرت حقيقة المرض

الربو

هو ضيق فى التنفس مصحوب بتزيق فى الشعب نتيجة تقلص فى عضلاتها وفى الغالب تنتاب المريض فى أواخر الليل وتستمر النوبة مدة ساعتين او اكثر وربما تستمر لبضعة ايام ثم تتلاشى وكأن لم يكن هناك شيء ثم تعاوده مرة اخرى وهكذا حتى تنغص على المريض حياته وكذا على أهله لانهم يتوهمون بأن مريضهم فى درجة من الخطورة وأنه مشرف على الموت من شدة الضيق الذى يعانيه وقت النوبة .

وضيق النفس يتسبب من (١) الكلتين أو (٢) القلب أو (٣) الشعب . أو (٤) سل الغدد الشعبه فيجب (أولا) لحسن التشخيص أستبعاد الربو الكاذب وذلك بتحليل البول ووجود زلال بكمية ملموسه فيه أو بعض الضغط الدموى ووجود ارتفاع ظاهر فيه . وهذا النوع من الربو ينتاب المريض عادة فى أول الليل أو فى النصف الاول منه يستمر الى الصباح ويشفى هذا بحقن الجلوكوز (السكر) الوريدية مع العلاج المناسب للزلال

(٢) لما الربو القلبى . فهذا يصيب أولا المتقدمين فى السن ويصحبه نصلب الشرايين وبالفحص يشاهد فى المريض تضخم الكبد نتيجة ابتداء هبوط الدورة الدموية وكذا احتقان فى قاعدة الرئتين أو أحداهما . فى العاده تنتاب المريض فى النصف الاول من الليل بعكس (الازمة) الربو الشعبى الذى يكون منشأه من التهاب الشعب وتقلصها فهذه تكون فى النصف الاخير من الليل . وقد يصاحب الربو القلبى فى معظم الاحيان نزلة شعبية مصحوبة بصفير فى الصدر يأتى بعد دور الاحتقان الرئوى وفى هذه الحالة تقرب الاعراض من اعراض الربو الحقيقى ولذلك سمى الربو القلبى بالربو الكاذب فيجب ملاحظة وجود العلامات المميزة الآتية

(ا) لغط فى صمام القلب

(ب) أو تضخم فى الاورطا وهو الشريان الرئيسى للجسم مع كبر حجم القلب

(ح) أو النهجة فى النفس ليست فى زمن الزفير (وهو اخراج النفس) بل زمن الشهيق فقط وهذه علامة هامه .

(ء) أو بفحص البصاق يوجد زلال بكثرة فى الربو الكاذب (أى المسبب عن القلب) لا يمكن العثور على خلايا ايزونوفيل الموجودة فى الربو الحقيقى .

والربو الحقيقى المسبب من الشعب تأتى نوباته فجأة دون سابق انذار بعد عدة عطسات أو سعال خفيف من الحنجرة وقد يظهر على صاحبها فى اليوم السابق زكام شديد أو تعرض سابق للبرد او عسر هضم بسبب أكله من الاسماك او الجبرى أو ما اشبه بيض الدجاج وفى بعض الحالات قد يسببها لحم الخنزير

العلاج

اثبت العلماء الفرنسيون أن الربو لا يصيب الرئتين القويتين ولذلك مهما تنوعت سبل العلاج يجب وضع هذا الامر نصب أعيننا والا انتكس المريض وعاوده الربو ولو بعد مدة طويلة .

ولهذا وجدت الوصفة التالية من احسن الوصفات التى يحسن ان يتناولها المريض بطريق الفم حتى ولو بعد الشفاء

صبغة اللوبليا ٢٠ ر .

كلوريدرات الافرزين ٠٣ر .

جلسرفوسفات الجير ٥٠ ر .

مستحلب زيت السمك الجبرى ١٥ جرام

ويأخذ منها المريض ملعقه كبيره قبل النوم ونصف ملعقة كبيرة فى الصباح وفى الظهر بعد الاكل بساعة ومع هذه الوصفة يحقن المريض بالفاكسين بمقادير صغيرة جداً اذا كانت تجاربه مثل حقن Cefede نمرة ١٩ فيستعمل يوم من السنتيمتر المكعب يوميا ومع هذا العلاج مقادير صغيره جدا من الذهب المخفف المائى هذا فى الاحوال المزمنة اما فى الاحوال الحاده التى لا تزيد مدتها على ٦ شهور فيحسن عمل زرع من البلغم لحقن المريض به ولم اجد غير حالات قليله لم تستفد من هذه الطريقة ويجب ملاحظة البدء بمقادير صغيره جدا مثل ½ سنتى مكعب فى اول حقنه ثم تزاد تدريجيا الى ½ سنتى بعد عشرة ايام ويجب عمل الحقن كل يومين او ثلاثه حسب تحمل المريض وزوال رد فعل الحقنة السابقة .

وقد نصح كثير من العلماء باعطاء مصل مخفف أو سائل بيتون ½ ٧ ٪ مقدار ½ سنتى فى الجلد نفسه حتى تعمل فقاعة صغيرة مثل لزعة الناموس وتكرر هذه كل يومين أو ثلاثة وقد حصل كثيرون على نتائج باهره من هذه الطريقة . اما حقن البيتون فى الوريد او تحت الجلد فلم تنجح معى بتاتا

والوقاية من مرض الربو : انصح بالوقاية من الزكام ما امكن لانه اذا اهمل الزكام فى الاشخاص المعرضين للربو فانه لابد أن يثير فى المريض نزلة شعبيه تقلصية وهذه اذا تكررت احدثت اعراض الربو بكل معانيها

ثانيا — يستحسن اخذ الفاكسين (الطعم) الوقائى من مرض الزكام وهذه عبارة عن عدد ٦ حقن مدرجة تؤخذ مرة فى السنه .

ثالثا — يجب تفاضى الدواء المقوى أنف الذكر أو الاستعاضة عنه بحبوب ايبون تحضير

معامل افراز المحتويه على فيتامين « د » ، « ا »

الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى على نوعين اما أن يقتصر الالتهاب على ما حول الشعب الصغيرة من حويصلات الرئه وانسجتها فيسمى الالتهاب (بالرئوى الشعبي) أو يصيب جزأ كبيراً من الرئه أو فصا باكمله أو أكثر من فصوص الرئه وعددها اثنان فى اليسرى وثلاثة فى اليمنى أو قد يصيب الرئه او الرئتين باكملهما ويسمى بالتهاب الرئوى الفصى .

فالالتهاب الرئوى الشعبي : كثير الحصول فى الاطفال والكهول على اثر نزله شعبيه حادة أو أو نتيجه تعرض المريض للبرد مع وجود ضعف مقاومه ورشح من الانف كذلك يحصل كمضاعفات الحصبه او احدى الحميات او التهاب شديد فى الفم أو الجيوب الانفيه أو أن يكون مضاعفة لطول مدة الاستلقاء على الظهر كما يحصل فى مرض الشلل .

وبمجرد حصول هذه المضاعفة ترتفع الحرارة عند المريض من ٥ ر ٣٧ أو ٣٨ الى ٥ ر ٣٩ فى المساء أو اكثر ثم تعود تنخفض الى ٥ ر ٣٧ أو أقل فى الصباح التالى الامر الذى يميز هذا الالتهاب من الالتهاب الفصى حيث تمكث الحرارة مرتفعة على وتيرة واحدة صباح مساء حتى تزول تماما فى اليوم السابع أو العاشر

والوقاية منه هذا الالتهاب

يجب علاج كل نزلة شعبية والعناية بها العناية الكافية حتى تخفى اعراضها تماما ولا سيما فى الاطفال على انه يجب الاعتناء بنظافة الفم والحلق اثناء اى حمى أو انفلوانزا حتى تمنع الجراثيم الموجودة

فى الفم من التوغل للمجارى الهوائية العليا ثم الى فروع القصبة الهوائية وما حولها هذا ويجب الاكثار من فحص صدور المرضى بالحميات مثل التيفوديه او الحصبة او القرمزية أو الطاعون أو مرض الحمرة أو النفاس حتى اذا وجدت علامات بسيطة للالتهاب الشعبي الخفيف اعطيت قسطا وافرا من العناية والاهتمام حتى تزول سريعا والا حصلت المضاعفات الرئوية وهذه بدورها تتطور الى خراج الرئة او الصديد فى البلورا فى نسب كبيرة منها .

وينصح بعض الاطباء للوقاية من المضاعفات الرئوية بأن يعطى المريض قرصا الى اثنين يوميا من اقراص الداجنان او السورافيل وهى تحتوى على عناصر السلفاميد المحتفظة للميكروبات المطهرة للمجارى الهوائية اذا ما لوحظ بعض العلامات للنزلة الشعبية الخفيفة اثناء احدى الامراض آنفة الذكر . ولتقصير مدة الالتهاب الرئوى الشعبي يعطى المريض غاز الاكسوجين استنشاقا من الانف او حقن تحت الجلد اذا لزم الامر مع حقن الفيتامين G مثل دوكسون واحسن قاتل للميكروب هى حبوب الداجنان أو حقن البنسيلين المكتشفة أخيرا .

وهنا تنوه بضرورة الانفلوجستين او ما اشبه حيث توضع يوميا على صدر المريض وظهره مهما تنوع العلاج .

ويجب فى حالة احتقان الكبد وظهور مبادىء ضعف الدورة الدموية الالتجاء السريع لحقن السكر المركز ٢٥ ٪ الى ٥٠ ٪ فى الوريد مرة الى اثنين يوميا مع نقط الكورامين او الديجتال ونصح بعضهم باعطاء الجلوكوز قبل ظهور ضعف الدورة بقصد منع حصولها ومساعدة الجسم لمقاومة الالتهاب .

ويعطى بعضهم حقن الكحول الوريدية لمنع الالتهاب ومضاعفاته . كما نصح بعضهم بحقن

الفحم الوريدية لمنع انتشار الالتهاب ومقاومته .

هذا ولا يجب التهاون فى اعطاء الاوكسوجين استنشاقا او حقنا جلدية اذا لوحظ زراق الشفتين أو خيف على القلب من الهبوط .

وتعمل الخراريج الصناعية فى الالتهاب الرئوى الشعبي بحقن ١ الى ٢ سنتى متر مكعب من روح التربنتين فى العضل فاذا حصل خراج كان علامة على حسن سير المرض وأن لم يحصل فيكون هذا دليل على سوء سير المرض وخطورته .

الالتهاب الرئوى الفصى

يحدث هذا الالتهاب فى سن الشباب وبالبالغ القوى عند التعرض للبرد القارس مع التعب والعدوى بميكروب البنيموكوك بسبب الزحام فى دور السينما والمسارح او المحلات العمومية المغلقة وكثيراً ما يكون الميكروب مستقراً من قبل مع غيره من الميكروبات فى الانف او الجارى الهوائية العليا حتى تجد الفرصة الموانية للتسرب للرئة او الوصول للدورة الدموية ثم الاستقرار بعد ذلك فى احدى فصوص الرئة بسبب البرد او التعب .

الاعراض : يشعر المريض بألم فى جنبه مع ارتفاع مفاجئ فى الحرارة يصل الى درجة الاربعين أو اكثر ورعشة شديدة مع سعال جاف ثم يظهر البلغم فى اليوم التالى مصحوبا بلون صدأ الحديد وتمكث الحرارة حتى اليوم السابع أو التاسع فتنخفض فجأة كما ظهرت ويصحب انخفاضها عرق غزير ويشمل الالتهاب الفصى جميع الفص أو اكثره وفى اغلب الاحيان يكون الفص الاسفل هو الملتهب . فاذا جاور الالتهاب الحجاب الحاجز كما يحصل فى الاطفال فان المريض يفاجأ بقيء وألم منعكس الى البطن بدلا من ان يكون الالم فى الجنب كما هو معروف وعندئذ يتوهم الطبيب عند رؤية المريض

لاول وهلة انه يشكو من علامات الزائدة الدورية فاذا وقف فى فحص الرئتين وعثر على علامة الالتهاب فى قاعدة الرئة زال هذا الالتباس .

عند الضعفاء : فى حالات كثيرة يكون الالتهاب فى الفص الاعلى من احدى الرئتين فيلتبس على الطبيب التشخيص بين الالتهاب الرئوى الفصى والدرن الرئوى الذى يميل غالبا لقمة الرئة للتمييز بينهما :—

اولا : تاريخ المرض والسعال واختلافهما فى الحالتين

ثانياً : فحص البلغم يظهر ميكروب النيموكوك او غالبا باسيل فريد لاندر فى الالتهاب الفصى الاعلى للرئة وباسيل الدرن فى الدرن الرئوى

ثالثاً : وجود علامات دماغية حادة مثل الهزيان واحمرار العينين فى الالتهاب الرئوى اما فى الدرن فان العلامات السحائية اذا ظهرت فانما تظهر على مريض شكا من السعال فيما مضى لمدة طويلة وتختلف فى شكلها اذ تؤثر على نقلص الرقبة حيث تنثنى الى الخلف مع بعض الغيبوبة كغيبوبة الالتهاب السحائى

رابعاً : ظهور الرعشة الفجائية والطفح على الشفتين من علامات الالتهاب الرئوى البسيط عند مدمنى الخمر : تظهر الاعراض العادية مضافاً اليها غيبوبة او هزيان متعب مصحوب بارتعاش فى الاطراف

فى السكبول : يكون الالتهاب الفصى عميقا فى وسط الرئة أو تحت الأبط ولذلك يصعب سماع علامات الالتهاب خصوصا وان الحرارة لا تكون مرتفعة كثيراً وفى حالات كثيرة تكون طبيعية ولا شيء عندهم يلفت نظر الطبيب الى الالتهاب الرئوى سوى أحمرار باطن كف اليدين وجفاف

اللسان وقلة البول عندهم وسرعة التنفس .

العلاج : يعطى المريض استنشاق الاكسوجين بطريق الفم او حقن تحت الجلد من ٢٥٠ — ٤٠٠ سنتيمتر مكعب مرتين يوميا خصوصا اذا وجد ضيق فى التنفس وعلامات ضعف فى القلب

ثانيا : حقن اوجيوب الداجنان او السورافيل المحتوية على السلفاناميد مع قليل من البرمايدون ٦ اقراص يوميا ويستحسن اعطاء بعض حقن الكافور أو السكر المركزة ٢٥ ٪ داخل الوريد بمقدار ١٠ — ٢٠ سنتى يوميا وقد ينصح بعض الاطباء باعطاء فيتامين (ج) حقنا فى العضل يوميا لأفراز سموم المرض وتقوية المريض

ثالثاً : يجب وضع المريض براحة تامة فى الفراش وتبرزه والتشديد على وضع مخدات تحت كتفيه حتى يكون وضعه بين الجلوس والنوم مع الانتفاوجسين المعتادة مع تكرارها كل اربعة وعشرين ساعة حتى الشفاء .

خراج الرئة

يسبب خراج الرئة من عدوى الاميبا المسببة للدوسنتاريا وكثير ما يحصل هذا بعد اختفاء اعراضها من الامعاء بزمن طويل . وهى فى الغالب اعراض الالتهاب الرئوى الحاد من سعال وألم فى الصدر مع بصاق مدمم او بدون دم .

ويكثر حصول الخراج كأحدى مضاعفات عمليات الأنف والحنجرة وعلى ذلك لمنع حصوله يجب اعطاء المريض املاح السلفاميد بعد العملية لمدة اسبوع او اكثر .

كذلك يتخذ نفس الاحتياط بعد عمليات الأذن .

ويحصل الخراج كمضاعفة للالتهاب الرئوى الفصى فبعد الاسبوع الأول من المرض تستمر الحرارة فى الارتفاع بدلا من انخفاضه المعهود ويستمر البلغم فى الزيادة أو يتغير طعم البلغم ويصير كريه الطعم والرائحة . وقد يفرغ الخراج مرة واحدة فيزداد البلغم عند المريض اما اذا كان تفريغ الخراج بطيئا فان كمية البلغم تستمر قليلة وبالاشعة يظهر الشكل المميز للخراج على شكل دائرة او بيضاوى نصفه الاعلى مملوء بالهواء والنصف الأسفل مملوء بالسائل الصديدى وقد يحصل الخراج



فى الرئة من ضعف المقاومة وتعرض المريض للبرد القارس كأن يخرج من مكان دافىء الى البرد دون أن يحتاط بغطاء أو معطف يقيه البرد فتحصل القشعريره أو الرعشة وسرعان ما تسرى الميكروبات الموجودة عادة فى الأنف الى الرئة مستمدة من ظروف الرعشة قوة اخرى لترسخ قدمها فى النسيج الرئوى

والعلاج : ينقسم الى قسمين طبى وجراحى : والطبى يتلخص فى حقن الامتين لخراج الأميبا أو حقن الكحول الوريدية بنسبة ٣٠ ٪ مع الجلوكوز للخراج المسبب عن ميكروب السبحى أو العنقودى أو البنيموكوك وتكرر يومياً بمقدار من ٢٠ — ٥٠ سنتيمتراً مكعباً واعطاء المريض

حقن فيتامين ه ٥ سنتيمتر كذلك يجب اعطاء مقادير من السلفاميد بطريق الفم مع هذه الحقن مع تحذير المريض من تعاطى سلفات الصودا الملينة أو سلفات الماغنيزيا أو البيض لما فى ذلك من الخطر عند استعمال السلفاميد .

وأعطى كثير من الاطباء مقادير من حقن السلفارسان ٠٫٤٥ كل ستة أيام فى الاحوال المستعصية انما لا يجب الاعتماد على العلاج الطبى أكثر من ستة أسابيع أو شهرين على الأكثر حتى لا تضيع على المريض فرصة تحمله العملية .

وشاهدنا حالات كثيرة من خراج الرئة حصلت مضاعفة لسرطان الرئة وكذا الكيس الديدانى السابق شرحه .

وبفحص الكرات البيضاء الدموية توجد متزايدة ويزيد عددها على ثلاثين الفا وهذه علامة مميزة لحصول التقيح .

العدوى الفطريه فى الرئتين

تنشأ هذه العدوى عن جرثومة فطرية أو عفنة تعيش غالبا على النبات والفاكهة والخضراوات والمزروعات والشعر والصوف الخام والحبوب ولهذا يتعرض المزارعون والمشتغلون فى الحقول واصحاب الحرف الذين يشتغلون فى القش والشعر ونتف الصوف والتنجيد والسروجية وكذا تربية الدواجن والحيوانات ويتعرض الكثير ممن يهتمون بتربية الحمام لعدوى نوع من هذا الفطر ذى لون غامق يسمى باشليون المدخن بسبب تزغيط صغار الحمام بالحبوب وهذه طريقة منتشرة فى الأرياف القصد منها الحصول على نتيجة سريعة فى تنمية فراخ الحمام من تزغيطها حتى تنمو وتترعرع بسرعة وهذا المرض يسير سيرا بسيطا فى الرئة ومن أهم صفاته أنه لا يؤثر كثيرا على

صحة المصاب به فنجده كثير السعال والبلغم مع ألم فى الصدر وغالبا يحصل بعض النزيف مرة أو اثنتين فى السنة دون أن تتأثر حالته العمومية وقلما نجده شاحب اللون كما يظهر على مرضى السل .

وهناك نوع آخر من القطر يسبب ارتفاعا فى الحرارة ويفاجىء الشخص مفاجأة كالالتهاب الرئوى الحاد بسخونة تبلغ فى ارتفاعها ٣٩ ° أو ٤٠ ° وهذا النوع طويل وينمو على اعـــواد الخضروات والفاكهـة والزهور فأذا كانت سن من الأسنان منآكلة أو نخزها السوس يسهل نمو هذا القطر على السن وما حولها بعد ذلك تنتقل العدوى للرئة فتصاب بالتهاب رئوى شعبى مزمن مصحوبا بتكهف وتآكل فى الخلايا وبالفحص بالاشعة تظهر عتامات عقدية محاطه برشح حولها واحيانا تظهر كالالتهاب الشعبى المزمن مع تليف كبير حول الشعب .

والصفة التشريحيـــة تشبه حاله السل الرئوى . ويفحص البصاق لا يظهر القطر بالفحص الميكروسكوبى العادى بل بطريقة التزريع فأذا ما اشتبه الطبيب المعالج بهذا النوع يجب الأسراع بفحص البصاق للقطر حتى اذا ماظهرت النتيجة إيجابية يسرع باعطاء المريض مركبات اليود أو يودور البوتاسيوم بمقادير قوية فحينئذ تبدأ الحرارة فى الهبوط وتأخذ حالة المريض فى التحسن سريعاً .

وفى حاله من الحالات التى ارسلت الى بمعرفة أحد الأطباء حالة ترزى اشتبه باصابته بالسل فى الرئتين وبفحصه بالأشعة لم يظهر سوى التهاب مزمن فى الشعب وكان بصاقه سلبياً للسل وترجع شكواه من ألم فى الصدر الى بضع سنوات مضت وكان ينتابه عرق غزير ليلا فى بعض الاحيـان وأخذ جسمه فى الهزال وزاد عليه ضيق التنفس وبالنسبة لصناعته وأن جو عمله كان يحتوى على غبار مشبع بخيوط الصوف فنصحته بفحص البلغم للقطر وقد وجد ايجابيا كما قدمن قبل وأعطى اليودور وشفى تماما .

فى حالة أخرى . كان رجلا يناهز الخمسين من عمره ويعمل سروجيا ومنجدا للسيارات وكان يشكو من سعال كثير مصحوب ببلغم مستمر طول النهار مما اثاق عليه راحته ونفر منه عملائه



صوره بالاشعه لصدر مصاب بالمرض القطرى ومن يراها يتصور انه مصاب بالسل الرئوى

وجيرانه . وكان لا يستطيع أن يسير أكثر من بضعة خطوات ولا يمكن أن يؤدى عملا .

لهذا فحص البصاق عدة مرات وكان سلبيا للميكروب الدرنى رغما عن أن صورة الأشعة كانت تؤكد هذا المرض كما هو واضح فى الصورة المأخوذة له .

وبفحص بصاقه للفطر وجد النوع الهليونى المدخن وباعطائه حقن اليود تحسن المريض وزال منه ضيق التنفس وقل البلغم الذى كان ينغص عليه راحته بمقدار النصف .

ولوقاية الرئة من الأمراض الفطرية يجب غسل الفم بسائل برمنجيات البوتاسيوم أو محلول اليود بعد تزغيط الحمام وعدم اهمال أى مرة من هذه المرات حتى يمنع العدوى . كذلك يجب تحاشى غبار المزروعات ووضع كمامه على الأنف جهد المستطاع وهذه الطريقة ولو انها تبدو غير عملية وصعبة التنفيذ بين المزارعين الا أنها تفيد فى اتقاء العدوى .

أخذ هذا الشخص يقتل يعود من البقول بين أسنانه وفى ذلك خطر العدوى الفطرى

كذلك يجب معالجة جروح الجلد وتطهيرها مباشرة ومعالجة تسلخات الغشاء المخاطى للفم وآكل الأضراس حيث لا تكون مرعى خصبا للجراثيم الفطرية الموجودة بكثرة بقرب المزروعات وفى أثناء ضريس الغلال . كذلك يسهل وصول هذه الجراثيم من التسلى بمضغ أطراف الورد وعيدان البقول حيث كثيرا ما نجد أشخاصا يضعونها بين أسنانهم بقصد التسلية بما فيها من خطر العدوى الفطريه للفم ثم انتقالها الى الرئتين والشعب مع الوقت .

الاحتقان الرئوى

يشاهد الاحتقان الرئوى كعلامة أولى الالتهاب الرئوى أو كمضاعفة للحمى التيفودية أو الأنفلونزا بأشكالها المختلفة أو الروماتزم المفصلى الحاد أو الملاريا أو العدوى بالسكولى باسيل البولى أو كمضاعفة للغدد الدرنة حول القصبة الهوائية وفى غير هذه الحالات يكون الاحتقان سلبياً اى نتيجة لغط فى القلب أو عدم انتظام ضرباته أو ضعف فى الدورة الدموية وركودها ويصيب قاعدتى الرئتين وقد يصحبه مع الوقت ارتشاح بلورادى .

وقد ذكر العلامة الفرنسى الدكتور ريتس بأن كثيرا من المرضى تبدأ معهم علامات السل الرئوى بأحتقان بسيط فى الرئة يتكرر فى نفس الموضع من وقت لآخر ولهذا الاحتقان العلامات الرئيسية للاحتقان العادى وقد وجه انظار الاطباء لضرورة فحص البصاق أو حقنه للارانب للتأكد من العدوى الدرنية التى قد تكون كامنة من قبل وتبدىء بظهورها على هذا الشكل.

وقد يرهن علماء آخرون بأن الاحتقان الرئوى الايجابى المصحوب برشح خفيف فى الغشاء يخفى وراءه غالبا غدد درنة فى صرة الرئة .

لذلك يجب اكتشاف وعلاج الاحتقان الراجع للاسباب الأخيرة حتى يمكن وقاية الرئة ودرء الخطر فى حينه .

الجزء الثـــانى

(الســـل)

ميكروب السل وتطوراته

إذا تمعنا فى شكل جرثومة المرض وانه فى معظم الاحيان يكون على شكل باسيل أى عصا ميكروسكوبية ومحاطة بطبقة من الشمع ليصعب على الكرات الدموية البيضاء افتراسها كباقى الميكروبات والجراثيم وان هذه الجرثومة تتغير الى شكل ميكروب سبحى أو حبيبى أو ما يسمى بما وراء الميكروسكوب (أو قابل التصفية) . لوجدنا انها جرثومة ماكرة لدرجة ما .



(شكل الميكروب كما يظهر فى البصاق)

وان الابحاث التى ظهرت فى العشر سنوات الماضية تؤيد الفكرة القديمة القائلة بأن ميكروب السل الذى اكتشفه العلامة كوخ لم يكن الشكل الوحيد الذى يعيش عليه الميكروب المسبب لمرض السل .

وقد أظهر العلامة كليب وجود باسيل سيانوفيل لا يأخذ الصبغة العادية لميكروب الدرن ويصحبه فى بعض الاحيان فى البؤرة المريضة . وأظهره على أشكال أخرى خلاف شكله المعروف . وقد دلل العلامه كارواشى البولندى على أهمية الشكل الحبيبى فى حلقة حياة الباسيل وأمكنه تغيير شكله بزرعه عدة مرات فى معمله ومن أهم العوامل التى تساعد على هذا التغيير هى عناصر المناعة أو أجسام المقاومة (Anti Bodies) فى الدورة الدموية وكذلك الكرات البيضاء ثم أمكنه التأكد من وجود الميكروبات على شكل سبحى متفرق (Cocci) فى افرازات المرض وصديده وكذلك فى الدم ومع الوقت تتحول هذه الى باسيل سيانوفيل وهذا يمكنه اختراق الانسجة السليمة وكذلك الاوعية الدموية . وبعد زمن وجيز يتحول الى الشكل العادى المغطى بالطبقةالشمعية. وقد أوضح العلامة كوخ فى حثيه أنه كلما زادت قوة الباسيل كلما قل ميله إلى التغلف بهذه المادة الشمعية .

وقد أثبت العلماء بأن الشكل الحبيبى هذا أخطر أشكال الميكروب سواء فى مرض الحيوان أو الانسان وأمكن العلامة كارواشى بأن يحصل على زرع كامل حبيبى من السائل النخاعى الشوكى فى حالات الالتهاب السحائى الدرنى .

وبتزريع البلغم بعد الانتيفورين أمكنه الحصول على ٣٠ زرعا على شكل سبحى متفرق وبتزريع البول امكنه الحصول على الشكل الحبيبى وفى حالة تزريعه من السائل البلورا وى وجد الميكروب على شكل سيانوفيل ويحقن باسيل السل فى وريد الارنب ويذبحه بعد ٦ — ٩ ساعات

أمكن العلامة كوسترلو من الحصول على مزارع على شكل سيانوفيل وغيره من الأشكال الغير مائلة للصبغة العادية . وهذه الجراثيم يمكن ترسيبها بواسطة مصل مخفف من دم مصاب بالسل الرئوى .

وأن اختفاء العلامات الكلينيكية من المريض لا يحتم اختفاء الميكروب من الجسم فأن هذا الميكروب وهو خال من الغلاف الشمعى فى الدورة الدموية يتحول أمام الأجسام المقاومة وأمام المناعة المكتسبة الى الشكل المغلف الشمعى . وهـــذا التحول يتسهل فى السل التجاربى بواسطة تكرار حقن الميكروب فى الدورة الدموية اذ كلما اكتسب الجسم مناعة كلما سهل على الميكروب الموجود فى الغـدد والخلايا لكى يتغلف ويصبح على الشكل الباسيلى العادى ليحمى نفسه من الاجسام المقاومة للعدوى Anti-bodies وقد قرر العلامة الدكتور فران بأنه عندما تصبح الجرثومة مغلفة فأن الجسم الحامل لها يعد معدوم المناعة بالنسبة للجرثومة نفسها . وأمكن العلماء تحويل الباسيل الى شكل فطرى (Streptotlorix) يحقن الباسيل فى الغشاء السطحى للأرنب وكذا فى خصيته أو كبده أو كليته وأمكن بعد ذلك من أرجاعه الى شكل باسيل يزرعها فى المعمل ويعتقد العلامة تيرانسون بأن الباسيل الدرنى ماهو الا نوع من انواع الفطر الرئوى Mycoses . ويستشهد بالشبه القوى بين مرض السل الرئوى ومرض الفطر من حيث الصفة التشريحية للمرض . ففى الاثنين توجد العقد التى تتجبن وكذلك البصاق المدمم أو النزيف الصدرى وكذلك ارتفاع الحرارة والالم الصدرى كذلك يوجد فى الاثنين التكهف فى الاصابة الرئوية ولهذا يجب فحص البصاق للتأكد من الميكروب المسبب للمرض .

والآن نصف الشكل الأخير وهو الفائق فى الصغر والقـــابل للتصفية وأمكن مروره فى مرشح ل ٣ ول ٢ وغشاء الكلوديون والصفة المرضية والاعراض لهذا الشكل تختلف عن بقية الانواع ففيه غالبا تتضخم الغدد فى جسم المريض وكذا الطحال وهو يسبب الهزال والضعف

قبل حصول السعال بزمن طويل وأحسن واسطه لتزريعه هو سائل صفار البيض وأمكن ارجاع هذا الشكل الى الشكل العادى بتزريعه انما يأخذ التحول هـــذا عدة خطوات فاولا يتحول الى الفطرى ثم الحبيبى ثم السيانوفيل .



وقد قسم العلامة كرواشى المرض فى رسالته النفيسة القيمة التى القاها على هيئة المؤتمر الدولى التاسع للسل الى ما يأتى : —

الدور الاول : حصول عدوى الشكل الفائق فى الصغر (Ultra-Virus) وهذه تسبب هزال وورم فى الغدد .

الدور الثانى : تسببه الاشكال المختلفة التى تتطور من الشكل السابق تسمى دور الالتهابات مثل التهاب الغشاء البلوراوى أو المناصل أو البريتون أو التهاب الدرنى الرئوى الحاد أو التهاب السحاق الخ الخ .

والدور الثالث : وهو دور حصول التخلف الشعبى للباسيل وظهور اصابات التكهف الدرنى والتجبن فى الرئتين .

(٣)



(٢)

(١)

(١) زرع من دم مريض بالسل على صفار بيض لمدة أربع أسابيع يظهر الباسيل على شكل باسيل الدفتريا سيانوفيل وبعض منهم قد أخذ الصبغة العادية التى تدل على التخلف الشعبى .

(٢) زرع حبيبى زرع للمرة الثانيه على وسط بطاطس مع مرق لحمة وقد تحول الحبيبى الى باسيل وسلاسل سبحية .

(٣) شكل حبيبى مأخوذ من زرع حبيبى زرع على صفار البيض مع الجلسرين ويلاحظ بجانب الشكل الحبيبى العادى يوجد حبات صغيرة جدا أخذة الصبغة العادية .

اعراض السل وعلاماته

فى أول خطواته

الحرارة — فقدان الشهية او ضعفها — انقباض الصدر — العرق المتزايد — خراج الدمر

التهاب الاوزتين المتكرر المتقيح — الأرق المتواصل — الم الصدر — البصاق المدمم أو الضارب للاحمرار — انقطاع الطمث (الحيض)

انه من المؤلم ان يفاجأ الطبيب المعالج لحاله مشابهه لمرض التيفود بتزيف من الصدر مع تطور الحاله الى سل حاد (مستعجل) أو ان تطور حالة نزلة شعبية الى سل حاد ايضا أو ان يكشف على المريض عدة مرات بالاشعة دون العثور على اى ارتشاح يفسر أحدى الأعراض آنفة الذكر ثم يصاب المريض بمرض السل بعد سنتين أو ثلاث فدرءا لهذه الاخطاء المؤلمه ولمنع هذه المفاجأت نقول أن كثيرا من الاشخاص يحملون فى لعابهم ميكروب المرض وهم لا يشكون من السعال او اى عارض آخر وفى ذلك يقول العلامة كالمث أنه يكاد لا يوجد فى المائة شخص ٧ او ٨ من لم يمسهم ميكروب المرض (انظر الاشعة الآتية)



شخص سليم وبالكشف عليه بالأشعة وجدت فى الرئة اليسرى بؤرة قديمة متكلسة وكذلك فى صرة الرئة عينها .

وعلى ذلك فأن الميكروب الكامن الهادى، فى الجسم قد يتطور لظروف اهمها السهر الطويل أو الاجهاد المضنى أو قلة التغذية أو لسبب الهزال — وعلى السبب الأول يعاق معظم الاساتذة اهمية كبرى حتى انهم يسمون هذا الداء بداء (السهر الطويل) وتوجد مهيجات للميكروب الكامن حققها العلماء واهمها الحمل والحمى القرمزية والأنفلونزا — ولما كان من الواضح انه قبل دخول المرض فى شكل التكهف أو التجبن بزمن طويل يمكن العثور على علامات ويمكن تلافى هذا التكهف أو التجبن فى الرئة . وهذه العلامات هو ما يسمى بالانذار وعلى الطبيب أن يكتشف هذا الانذار فى حينه ليوفر على الرئه انتشار المرض فيها

وهذا الانذار : اما ان تأتى سريعا على شكل نزيف أو بصاق مدمم أو ارتفاع فى الحرارة أو على شكل ارتشاح فى الغشاء البلورادى المبطن للتجويف الصدرى .....

وما أن يأتى روبدا — واهم الاعراض التى يجب على الطبيب ملاحظتها واكتشافها هو .

(١) ضعف عام (٢)فقدان الشهية أو ضعفها (٣) بعض الهزال (٤) شحوب اللون (٥) العرق المتزايد سيما فى الليل واثناء النوم (٦) ارتفاع الحرارة ويكون فى الغالب قليلا نحو ٣ خطوط اى ٣/٥ من الدرجة أو ٣/٥ مثلا وفى احوال كثيرة لا يسجل الترمومتر اى ارتفاع فى الحرارة بل بالعكس تكون الحرارة منخفضة نوعا فى الفم وهذا الأمر راجع لضعف الدورة الدموية لسبب امتصاص سموم الميكروب الكامن فى الغدد او غيرها . ويجب عند الاشتباة فى هؤلاء الضعفاء ان نضع الترمومتر تحت الأبط واضافه ٤/١ درجة وهو الفرق بين حرارة الجلد وحرارة اللسان فى الشخص السليم فاذا سجل الترمومتر ٣٧ تحت الأبط فلنعلم بأن حرارة المريض هى ٣٧ ١/٤ وعلى ذلك يجب العناية فى تفسير باقى الأعراض والتعب الذى يشكو منه المريض .

ولنعلم بأن البصاق يكون قليلا فى هذه الحالات ولا يتعدى حركة تسليك الزور والحنجرة كأن يشعر المريض كأن شيئا عالق فى حنجرته يجره على التنحنح من وقت لآخر . اما اذا وجد

سعال قليل مع بعض بلغم صغير فقط فيجب الا تكتفى بتحليله ميكروسكوبيا حيث كثيرا ما يكون البصاق سلبيا فى اول اطوار المرض وقد ذكر العلامة جرانشيه بأن فى أول المرض تكون النتيجة سلبية فى ٦ أو ٧ مرات ثم فى المرة التالية قد تكون ايجابية . ولذلك ينصح بحقن قليل من البصاق السلبى فى الفيران البيضاء وبفحصها بعد فترة من الزمن وهذه هى الطريقة الصواب والبعيدة عن الخطأ والشك .

ومن العلامات التى تبعث على الحذر والشك هى .

(ا) حصول اعراض اضطراب فى المعدة يلازم صاحبه شهرين الى خمسة شهور دون الاهتمام به على ان هذا العارض فى شخص لم يتعود فى حياته على عسر الهضم فهو عارض له قيمته ويدل على امتصاص سموم الميكروب الموجودة داخل الجسم قبل ان يظهر بوضوح فى الصدر أو ان يشكو المريض من حركة احتقانيه حديثه أو التهاب قديم فى الغشاء البلوراوى الأيسر

(ب) يؤكد العلامة ونجفيلد بأن حصول الزكام المتكرر وتعدد اصابه الشخص بالانفلونزا أو اطالتها معه او حصول السعال المتكرر فى فصل الصيف هى علامات تلفت نظر الطبيب للاشتباه فى العدوى وليست بدليل اكثر من الاشتباه ويجب تثبت هذا الدليل بدقة الفحص بالاشعة

(ج) ان وجود سائل بلوراوى فى التجويف الصدرى هو برهان قاطع للسل فى اول ادواره سيما اذا حقن قليل من السائل لأحدى الفيران البيضاء . وان معظم الارتشاحات البلوراويه الغير مسببة عن مرض فى القلب أو الكليتين يكون العامل المسبب لها هو باسيل الدرن .

(د) ان وجود الارق فى شخص يسعل قليلا أو يشكو من علامة من العلامات المذكورة سابقاً تزيد فى شك الطبيب واشتباهه فى وجود امتصاص لسموم الميكروب التى ابتدأت تؤثر على عضلات القلب ثم على الدورة الدموية المخية

(هـ) ان الآلام الصدرية مهما تكن بسيطة فهي من الأهمية بمكان مهما فى زمن الشباب أما إذا كانت فى زمن الكبر والكهولة فتكون من علامات سرطان الرئة . لهذا كان من الواجب على كل طبيب أن يحيل كل مريض يشكو من الآم فى الصدر إلى الفحص بأشعة X بمعرفة الاخصائى أو لتصوير صورة بدقة بمعرفة اخصائى الأشعة . وأعنى بدقة أى أن لا يعطى الصورة الا ما يناسب كبر الصدر وصغره من الزمن وقوة الاشعة لأنها إذا زادت قليلا أو عرض الفلم لوقت أطول من الواجب لاختفت من الصورة الاصابة الصغيرة أو صغرت عن حجمها الطبيعى فتظهر صغيرة عديمة الأهمية فى حين أنها خلاف ذلك .

(و) بحة الصوت أو خشونته : إذا طال زمن هذين العارضين أو احدهما فى مريض يلزم فحص صدرة بالاشعة إذ كثيرا ما يبتدىء مرض السل الرئوى بهذا العارض .

(ز) تأتى بعد ذلك علامة من العلامات الهامة وقد لفت اليها أنظار الاطباء فى بحث القيته على هيئة المؤتمر الطبى سنة ١٩٢٣ وقد اكتشفتها بطول البحث والاستقصاء .

هذه العلامة هى ظهور قوس ابيض اللون على اطراف الاظافر وهى تظهر قبل علامة احدوداب الأظافر المعروفة من قديم الزمن بمدة تتفاوت من سنتين الى ثلاثة أو أكثر وحيث ان علامة الاحدوداب المعروفة من قديم الزمن هى عديمة الأهمية لأنها لا تظهر الا مع التكهف وامتصاص سموم المرض زمنا طويلا لهذا فان اكتشاف هذه الظاهرة الاولى للمرض والبحث عنها هو درء لخطر المرض وتقدمه وهذا القوس الفاتح اللون كما ذكرت يبدو واضحا للعين المجاورية موازيا لحافة الأظفر من طرفه ويعلوها بمقدار ملليمتر أو اثنين ويمتد فى معظم الاحيان قوس آخر موازى له واعمق منه لونا وعرض الاول والثانى نحو ½ إلى ١½ ملليمتر وانى أعزو السبب فى كون لونها فاتح واقتح من لون الاظفر نفسه نظراً للخلايا الليفية التى تثيرها سموم الميكروب

فى أنسجة لحمية الأظفر أو ما يسمى (فراش الأظفر) وبالنسبة لوضع اليـــدين الراحلى، دواما سواء فى السير أو الوقوف فان اطراف الاصابع مع أطراف الأظافر السفلى تعانى أكثر اعضاء الجسم من هذه السحريم ومن اثارة التليف فيها وقد سميت هذا القوس Arcus, Dystrophicus ومع الوقت فان نمو الخلايا التليفية وانكماشها فى طرف الظفر شيئا فشيئا تشد على أنسجة الظفر وتؤثر على اتجاه خط نموه وتجعله محدودبا وتكون النتيجة حصول درجات مختلفة من اعوجاج خط نمو الاظفر فى أصابع اليد المختلفة . وأكبر هذه الدرجات ما هو معروف من قديم الزمن (كما ذكر من قبل) بالاحدودباب Clubbing ويلاحظ القوص الظفـــرى فى أصبع السبابة أو الوسطى أولائم يظهر بعد ذلك فى بقية الاصابع وتزداد أهمية إذا صحبه علامه أخرى من العلامات سالفة الذكر



القوس الظفرى فاتح اللون

ولا يجوز اعارة اختفاء السعال والبصاق أهمية فى خصص أى مريض فكثيرا ما يبتدىء المرض دون وجودهما .

والألم البلوراوى هو علامة ثابتة وكثيرا ما يظهر بشكل تنميل فى مقدم الصدر أو ضغط أو بالاحساس بالحرارة أو السخونة من وقت لآخر فى الضلوع أو الحـــانبين . وبالتدقيق بالاشعـــة النظرية تظهر علامات تضخم صرة الرئة أو كثافة فى الفضاء البلوراوى . لذلك

يجب هنا أن أكرر ملاحظتي السابقة على صور الاشعة بأنها كثيراً ما تسبب أغلاطاً إذا لم تعط وقتها المناسب تقل عن الضعفاء والاطفال وتزاد عند ممتلىء الجسم . ولنعلم أن ظلال القلب في الصورة هو دليل على صحة الوقت وقوة الأشعة الملائمة فاذا كانت الأشعة أو وقتها أكثر من اللازم فان هذه الظلال تكون خفيفة وتظهر وراءها ظلال الفقرات الصدرية وأطراف الضلوع المتصلة بهذه الفقرات وواجب أن ظلال القلب تكون من العتامة بدرجة كافية لتخفي وراءها تفاصيل ظلال الفقرات

وكما أن الصورة ضرورية لتشخيص الأمراض الصدرية فكذا الفحص النظري باليد المجردة له قيمة ويجب عدم اهماله لفحص حركة الحجاب الحاجز في الناحيتين وكذا لمعرفة قوة اعضاء قفة الرئتين فان أقل تغيير فيها يبرهن على بدء حصول حالة مرضية في الرئة . كذلك بالفحص النظري يمكن الاستدلال على تضخم الغدد الموجودة وراء القلب من عدمه . وهنالك علامة لها اهميتها في تشخيص المرض في حينه وهي الاحساس بهبوط في قوة الجسم والتعب السريع من المشي أو العمل العادي . هاتين العلامتين تكونا غير مصحوبتين بالهزال أو فقد الوزن المعروف ويجب أن يحيل الطبيب مثل هؤلاء الاشخاص لطبيب الاشعة أو طبيب الصدر الذي كثيراً ما يكشف لديهم اصابات متقدمة في احدى الرئتين بدون وجود السعال أو الهزال المعروفين

الظروف المثيرة للاصابة

سبق ان نوهنا بأختصار عن بعض هذه الظروف مثل السهر المتواصل والمجهود الجسماني بكل انواعه وقد فسره العلامه بيرانسون والأستاذ برون بأن اهمية الراحة لم تكن لتعوض اهمية المجهود المبذول . فمثلا المبالغة في الدرس والتحضير الامتحانات أو المبالغة في الرياضة وهذه معروف

عنها فائدتها بمقادير صغيرة اومعتدلة فسرعان ما يتحول الى عكس المقصود منها عند عمل المسابقات الرياضية المنهكة فكم من مرة حضر لعيادتى رياضيون غواه أو رياضيون محترفون وابطال متفوقون معروفون وبفحصهم وجدت الرئة مصابه ..... هذه هى نتيجة الرياضة كما نطبق حالياً ! ويجب أن يكون لنا الشجاعة لنقولها بملء فينا .

وكأن يكون المجهود فى مهنة الشخص داخل غرفة غير صحية أو كأن يعمل الشخص داخل ورشة ليلية فأنه مهما اخذ الجسم من نصيب الراحة والنوم فى النهار فلا يمكن أن يعوض تغذية النوم الليلى حيث ثبت ان النوم فى النهار يكون متقطع وغير عميق ولا يعطى اثناءه القوة الكافية لتجديد الخلايا الواجب تجديدها اثناء النوم (متابولزم) ؛ ومن اصحاب الحرف الليلية واللذين كثيراً ما يجد السل مرعى صالحاً بينهم ما يأتى : الخبازين وعاملات الكيماويات والملاهى الليلية والعاهرات . كذلك يجد ان غواه الرقص والمشتركين فى مسابقاته معرضين للاصابة بالمرض وهنا يجب الا ننسى ان الافراط النسائى من العوامل الهامة فى هدم مقاومة الجسم ضد العدوى .

وبجانب المجهود الجسمانى يعمل المجهود العقلى اسمشاكل عائليه مثل طلاق أومتاعب قضائية او ان يصاب شخص بمصيبةمالية او وفاة عائلية فتعرمل سيده او يترمل زوج فتعكر ظروف الحياة من سيء الى أسوأ فينسى الشخص نفسه وينسى أكله وبذلك يشترك عاملان معاً عامل ضعف التغذية مع عامل المجهود العقلى .

والآن مع ظروف المدنية الحديثة استجد نوع خطير من المواد فالسيدات والآنسات مندفعات وراء هذه الموجة بالمحافظة على نحافة الاجسام ونحسين رونقهن مع اخذ اهوية قساعد على النحافة أو الابتعاد عن المغذيات وتقابل كمية الأكل مع ما فيه من خطر على صحتهم وقد شاهدنا كثيرا من الآنسات يستعملن الخل لهذا الغرض فكانت النتيجة التهاب المعدة واضعاف

الرئتين فظهور حركة حمية هى حمى الضعف الناشىء من تضخم غدد الرئتين .

لذلك يجب تحذير اولئكن من خطر هذه المودة وأنها تؤهل لاثارة الميكروب الكامن .



وقد شاهدنا أصابة درنه فى الرئة أثر حصول مصارمة على الصدر نتيجة تصادم قطار أو سيارة او على أثر عملية جراحية فى الصدر .

وقد وجدنا أن النساء معرضات للخطر اكثر من الرجال والنسبة لتركيب اجسامهن وطريقة تنفسهن ففى حركة الشهيق يتحرك الصدر عند السيدة اكثر من حركة البطن بعكس الرجل ففى الشهيق يتحرك البطن اكثر من الصدر .

وهذا يحمل الصدر والرئتين مجهودا عند المرأة اكثر منه عند الرجل وجنبين هذا من الشكل

خطر المغالاة بالأشعة قرب البحار

(وهي من أهم الظروف المثيرة للاصابة)

بعد أن بينا فوائد الاشعة الضوئية فى مقاومة أمراض الصدر بمقادير صغيرة لزم علينا أن نشرح مضار الاكثار منها سيما قرب البحار وبرك السباحة التى تزيد الجو تشبعا بهذه الأشعة لسبب انكسار أشعة الشمس على الأمواج من جهة وعلى طبقة الجو القريبة من المياه لازدياد كثافة البخار فيها . ولما كانت هذه الأشعة تثير فى الاصابات الكامنة تفاعلا رديا واحتقانات رئوية . ولما كانت السواحل تقصد المصطافين للترويح عن النفس للاستفادة من حمام البحر « وحمام الشمس » بعد الانتهاء من فترة الدراسة وهناك تتوفر أسباب اللهو للشبان والشابات فيمضى الوقت سريعا وهم لاهون فتحمر أجسامهم وتحترق بشرتهم وكثيرا ما يتباهون بهذه النتيجة « ولا يزالوا يتهافتون ساعات على التعرض لأشعة الشمس وهذه قوية بحرارتها أو ما يسمى بالاشعة تحت الحمراء ومن خاصتها احداث سخونة فى الجسم وتعرضه للزكام وتضعف مقاومته للامراض كما سبق الاشارة الى ذلك . ولما كانت الاشعة فوق البنفسجية تسبب احتقانا فى الرئتين عند المغالاة فيها كما ذكرنا فان الكثير من هؤلاء الشبان والشابات يعودون من المصايف ومعهم حركة حمية أو نفث دموى غالبا فاذا عولج المريض منهم بسرعة فان هذا الاحتقان يزول . أما اذا لم يبادر بعلاجه فان هذا الاحتقان يمهد السبيل الى التكهف فى الاصابة أو حصول ارتشاح درنى يلزمه عملية ابرة الهواء او الاسترواح الصدرى ويستمر المريض على هذا النوع من العلاج حسبما يراه الطبيب المتفرغ للامراض الصدرية .

وأن أنس لا أنسى حالات عديدة حضرت لعيادتى بعد انتهاء فصل الصيف ومعها سعال شديد مصحوب بحمى وفحصتها باشعة X ووجدت فى الرئة اصابات حادة وارتشاح درنى سببه

المغالاة فى التعرض لأشعة الشمس . وكل شىء اذا مازاد عن حده انقلب الى ضده وقد اثبت العلماء الامريكيون أن زيادة الاشعة أو زيادة الفيتامين « د » بدلا من أن تثبت الجير فى الجسم كما هو الحال فى المقادير الصغيرة منها فانها تعمل على ازالته من الجسم وخصوصا من الاصابات الدرنية المتكلسة القديمة . ولهذا السبب تثور الغدد أو تهيج الرئة فى الاجسام الضعيفة وفى الصدور المستعدة لهذا المرض وحينئذ تظهر فى البول املاح الجير بكثرة .

الحالة الأولى : ج . م عمرها ست سنوات عادت من المصيف ومعها سعال شديد ودرجة حرارة ٣٧½ وكشف عليها بالاشعة فوجدت الغدد فى صرة الرئة كبيرة وفى حالة غير طبيعية وقد عالجها بعض الاطباء باملاح الذهب حقنا فى العضل بدون فائدة « وسنعود لذكر خطر الذهب فى علاج حالات الدرن المصحوبة بارتفاع فى الحرارة » . فوضعت هذه المريضة على حقن الكولين مع مستحلب زيت السمك الجيرى والاشعة فوق البنفسجية بمقادير لا تزيد عن خمسة دقائق كل يومين لمدة خمسة عشرة جلسة فشفيت تماما وقد نصحنا والدتها باراحتها هذا العام عن حضور المدرسة حتى تسترد قوتها تماما .

الحالة الثانية : موظف فى احدى البيوتات المالية بالقاهرة حضر من مصيف قريب من الشاطىء بعد مغالاته بضعة ساعات يوميا وهو يجارى الجسم قرب مياه البحر المنعشة قبل الغذاء ثم بعده وناسيا نفسه بسبب اللهو المتوفر دون تقدير لعواقب الامور فحضر ومعه سعال مدمم مع حركة حمية وضع على علاج الراحة التامة لمدة عشرين يوما مع حقن مركبات الكولين حتى زالت الحرارة ولما أصبحت حالته طبيعية من عدة وجوه . أمكن اعطاؤه مقادير صغيرة خمسة دقائق من الاشعة فوق البنفسجية مرة فى الاسبوع لتساعد على تثبيت الجير فى الجسم .

الحالة الثالثة : موظف فى مدرسة ثانوية بالقاهرة حضر من المصيف ومعه حرارة مرتفعة

تبلغ الاربعين وبالاشعة وجدت الرئة اليمنى مصابة بالتهاب درنى كامل فى الفص الأعلى الايمن وقد أرسل للمصحة للعلاج .

الحالة الرابعة : آنسه ذ . ح . تبلغ من العمر عشرين عاما عادت من المصيف بعد تعرضها كثيرا بالساعات الطويلة على الشاطىء وكانت تشكو من حركة حمية وعولجت على اعتبارها حمى تيفودية



(من مجموعة المؤلف)

تبين هذه الاشعة احتقان بجانب البلورا من الرئة اليمنى وقد ابتدأ بحمى مرتفعة ومكثت المريضة تعالج مدة طويلة على أنها تيفودية رغم التحليل المتكرر السلبى للفيدال .

مدة طويلة بدون فائدة ولم تكن تشعر بألم فى الصدر أو سعال بالمره وحضرت الى بعد ذلك فكشفت عليها بالاشعة فوجد احتقان فى الرئة اليمنى مصحوب بالتهاب فى الغشاء البلورا وى وقد عمل لها حقن الهواء مع الراحة التامة فى الفراش ومع مركبات الكولين ومستحلب زيت السمك الجيرى فشفيت تماما بعد فترة اربعة شهور وقد مضى على ذلك نحو خمس سنوات وقد تزوجت بعد ذلك وهى فى صحة تامة حتى الآن .

السل فى الاطفال

يختلف المرض فى الأطفال عن الكبار بأن تقتصر عدواه على الغدد المجاورة للقصبة الهوائية أو الشعب دون أن تنتشر فى خلال الرئة الا أنه يجوز حصول عدوى الرئة وحدها او تمتد منها الى الرئة وبالعكس وهذا النوع من العدوى يجوز حصوله فى البالغين سيما فى السودانيين والبرابره والهنود والامريكيين ولسهولة تشخيصه يجب الاهتمام بدراسة ما يأتى :—

تاريخ المرض : يجب التدقيق فى بحث تاريخ المرض وعلاقة الطفل بأى شخص مصاب بالعدوى او كان مريضا فأن طول تعرض الطفل واحتكاكه لشخص حامل الميكروب يسبب العدوى .

وزن الطفل : قد يكون الطفل وهو مصاب بالمرض ذا سمنة مفرطة كما شوهد المرض فى متوسطى البنية والضعفاء منهم — لذلك يخطىء الطبيب اذا اختصر على فحص الضعفاء من الأطفال فان أنسى لا أنسى طفلين حضرا لعيادتى وهما فى أحسن مظاهر الصحة والعافية وكانا يحملان عدوى سريعة من المرض :

التعب السريع : ان الاحساس بالتعب السريع لأقل مجهود يلاحظ فى الأطفال حاملى الميكروب ولذلك أهتم الأطباء فى العناية بهذه العلامة أذ تكون فى كثير من الأحيان العارض

الوحيد الذى يشكو منه الطفل حامل المرض ولذلك نوجه نظر الطبيب لدقة فحصه بالأشعة وعمل التحليل الآتى :—

تحليل البراز : يجب فحص البراز فى الأطفال المشتبه فيهم لأنهم غالبا يبلعون البلغم دون بصقة وكثيرا ما يندر السعال عندهم فأذا حلل البراز أو العصير المعدى أمكن العثور على باسيل الدرن .

الحرارة : أن حرارة الأطفال العادية كثيرا ما تزيد عن حرارة البالغين بمقدار ½ درجة الا أن استمرار هـذه الزيادة صباح مساء لمدة طويلة يجب أن ينظر اليها نظرة جدية للوصول الى السبب الحقيقى لها . ومن جهة أخرى فكثيرا ما تكون حرارة الأطفال المصابين فى حين الطبيعى .

الأرتشاح البلوراوى : هذا العارض كثير الحصول فى الأطفال وهو أن لم يكن مسبباً عن الروماتزم أو مرض فى القلب فان سببه الأصلى هو باسيل الدرن .

الفحص بالتيركلين : اذا عرض الطفل لميكروب الدرن وأصبح حاملا له فأن جسمه يكتسب نوعا من المناعة يسمى الحاسبة أو الألرجى Allergy وهـذه تحدث تفاعلا فى الجلد اذا تعرض الجلد لكمية صغيرة مخففة من التيركلين والتيركلين على أنواع .

(١) تيركلين كوخ القـديم مأخوذ من تصفية زرع الباسيل المزروع على مزرعة سائلة لمدة بضعة أسابيع وعمل خلاصة جلسيرينيه من المواد المفرزة من الميكروب .

(٢) تيركلين كوخ الجديد . هذا الزرع مأخوذ من تكسير واتلاف الميكروب نفسه سواء بالمواد الكيماوية أو بطريقة ميكانيكيه وعمل خلاصة سائلة منه وفيهـا توجد عناصر الميكروب نفسه وليست من مواد مفرزة من الميكروب كما فى النوع الأول .

(٣) مزيج من الأول والثانى .

(٤) طعم من الميكروب بعد قتله أو بعد ازالة الغلاف الشمعى منه بطريقة الفرمالين أو الأسيتون ثم يعمل سائل مستخلب منه .

وطريقة الفحص هو إما حقن مقادير صغيرة ومخففه من ١ ٪ — ٤ ٪ فى الجلد نفسه أو تعمل تشريط كالتطعيم ضد الجدرى وتعمل مقابلها تشريطات بماء معقم كدليل جانبي يقارن به رد الفعل الحاصل بعد يوم أو يومين فاذا حصل التفاعل دل على وجود العدوى .

وهناك طريقة أخرى للفحص على شكل قطعة مشمع لاصق به ٣ مربعات صغيرة من ورق النشاف مشبعة احداهما بالتيركلين B البقرى والثانية مشبعة بسائل المقارنة C والثالثة مشبعة بالتيركلين H الأنسانى ويستعمل سائل منقى تبلغ قوته من ٢½ — ٣ مرات قوة التيركلين العادى . . .

وفى حالة التفاعل الايجابى يحدث رد فعل على الجلد ذو حدود ظاهرة ناطقة وتمتاز هذه الطريقة بسهولتها وسرعة عملها .

وقد أثبت العلامة بركيه أن التفاعل الايجابى الذى يدل على العدوى فى الاطفال دون الثانية من عمرهم يكون بنسبة ١٠ ٪ وهذه النسبة تزيد بسرعة حتى تصل فى سن الرابعة عشر الى ٧٠ ٪ و ٩٠ ٪ وقد فحص العلامة برنارد الاطفال الذين دون السنة فوجد أنه فى حالة مرض الام تصل نسبة التفاعل الايجابى إلى ٧٦ ٪ والى ١٦ ٪ فقط فى حالة مرض الأب ولم تزد عن ٦ و ٧ ٪ فى حالة مرض عضو آخر من العائلة أو خادم يقيم فى المنزل .

وقد أثبت أيضا أن من النادر جدا أن يكون التفاعل ايجابيا فى الاطفال الحديثى الولادة على أن التفاعل الايجابى قد يختفى ويتحول إلى سلبى إذا ما أصاب الطفل مرض الحصبة أو السعال الديكى إذ تخف المناعة فى الدورة الدموية بسبب أحد هذين المرضين ولذا يكون الطفل فى هذه

الفترة معرضا للاصابة الصدرية وإثارة الميكروب فى خلايا الرئة .

لذلك حرص الاطباء فى الزمن السابق على الاهتمام بدور النقاهة من الامراض المعدية وخاصة الحصبة والسعال الديكى لما يتبعها من اختفاء المقاومة Allergy فى هذه الفترات وان يجب فى اثناء النقاهة تقوية المريض بالكلسيوم والحقن الجبرية أو اعطاء الفيتامين بالفم لتحاشى مضاعفات سيئة فى الرئتين .

الفحص البكتريولوجى : فى معظم الاحوال يكون البصاق سلبيا إلا إذا كانت الاصابة على شكل تكهف أو تحين ففيها يكون البصاق ايجابيا وقد نوهنا بصعوبة الحصول على البصاق من الاطفال لأنهم يبلعونه ولا يجب الاهتمام كثيرا بعدم وجود الباسيل فى البصاق أو البراز بل يجب التأكد من فحص الطفل بالأشعة واعطائها القوة المناسبة وإلا اختفت الاصابات الصغيرة من الصورة بالأشعة القوية أو لأعطائها وقتا أزيد من اللازم

والعلاج يتلخص فى وضع الطفل فى المصحة أو مكان صحى مع الراحة اللازمة ولشفائه يجب أن يكشف عليه كل سنه حتى يمنع حصول أى نكسه ويوضع تحت الملاحظة لمدة ٣ سنوات حتى يسترد صحته الاولى .

وقاية الاطفال

يجب فصل الرضيع عن امه المصابة لسببين أولا حتى لا تسوء حالتها بمجهود الرضاعة وما يستمده الطفل من قوى الأم وتغذيتها وثانيا حتى لا تسرى العدوى للطفل من أمه .

وقد خصصت الحكومات دور للوقايه يختلف بعضها عن الآخر فى البناء والنظام . ففى فرنسا يؤخذ الطفل ويرسل للارياف ويؤجر له مرضع تكلف بأن تعيش عيشة صحية خاصة

وأن يكون سكنها صحيا ويراقبها طبيب مختص إما بالحضور اليه من وقت لآخر أو بمرور زائرة صحية تعطيها النصائح وتمدها بكل ما تحتاج اليه . وفى الدائرك دوراً مخصصة للوقاية تربى فيها الأطفال حتى الخامسة من عمرهم وهذه الدور مبنية بطريقة تجعل أشعة الشمس تتخلل الغرف على مدار ساعات النهار وكأن كل غرفة هى مصح مستقل فى ذاته . إذا شاء الأب فانه يسترد ابنه عند غروب الشمس يوميا وإذا شاء يعيش الطفل فى هذا المصح الوقائى حتى يربو عن الخامسة فيقوى ويتغلب على العدوى البسيطة التى يكون قد تعرض لها اثناء رضاعته من أمه واختلاطه بها قبل عزله فى المصح . وقد يكون الطفل مرتفع الحرارة فى بادىء الامر لا يلبث أن تعود حرارته للطبيعى بعد فترة قليلة من الوقت بعد تغيير اسلوب معيشته من حيث الراحة والهواء الطلق — وفى كثير من هذه المصحات رأيناهم يستعينون بأجهزة من الأشعة فوق البنفسجية سيما الأجهزة الضخمة مثل قوس فولتا لتقوية الأطفال فيعرضونهم للاشعة مبتدئين باربع دقائق كل يومين وتزاد دقيقتين فى الفترة حتى تصل الى عشر دقائق نصفها على مقدم الجسم والنصف الآخر على الظهر — ويشترط أن تكون حرارة الطفل طبيعية قبل البدء بالأشعة بزمن طويل .

حمى السل الشبيهة بالتيفود

كثيرا ما يبتدىء المرض الصدرى على شكل حمى صعبة التشخيص دون سابق انذار كأن يسعل المريض من قبل ولما كان الالتهاب من الخطورة بمكان اذ يختلف نظام الاكل فى كليهما الصيام مفيد فى التيفودية خطر على الثانية — ولذلك تقع أهمية التشخيص فى أولا : ثلاثى خطورة الصيام بسبب الالتهاب . وثانيا : لمعرفة الحالة قبل أن يتركز المرض فى ثانيهما سواء بحصول ارتشاح فى الرئة الذى كثيرا ما ينتهى ويودى بحياة المريض أو أن يترك وراءه اصابة جسيمة صعبة الشفاء .

ويتكون هذا المرض من حلقة أعراض نتيجة سموم ميكروب السرن العائم فى الدورة الدموية وقد وصلها من بؤرة قديمة كامنة فى الجسم وتظهر بشكل حمى مثل باقى الحميات مصحوبة بتضخم الطحال غالباً ودون أن يصحبها سعال أو بصاق .

وهى كثيرة الحصول فى سن الشباب أو الاطفال ولا يتحتم أن يكون الجسم نحيفـــاً أو هزيلا فكثيراً ما شوهدت حالات فى جسم ممتلىء صحة وعافية انما يكون الصدر فى الغالب غير مستديرة ومفرطحا نوعا أو مستطيلا ضيقاً

ويمكن للمريض أن يأتى بنفسه وسائرا على قدميه دون أن يشعر بقوة الحرارة قائلا لطبيبه أنه منحرف الصحة قليـــلا والشدة دهشته عندما يقيسها له الطبيب ويخبره بقوتها وانها جاوزت الاربعين سنتيجراد .

ومما يستحق الذكران العلامة لاندوزى هو أول من وصف هذا المرض سنة ١٨٨٢ وأضاف فصلا جديدا على اشكال مرض السل الحاد ـ ثم نشر بعد ذلك تجاربه فى مؤتمر السل الدولى بواشنجتون سنة ١٩٠٨ على الحيوان الصغير وقد تمكن من احداث شكل الحمى عليها .

الاعراض : تبتدىء غالبا بارتفاع خفائى فى الحرارة التى تكون غير منتظمة ويكون النبض سريع بعكس الحمى التيفودية وبفحص الصدر المتكرر الدقيق لا يمكن العثور على أى تغيير فيه وقد يشعر المريض بانقباض فى الصدر أو بتألم من ناحية . وهى الناحية التى قد يتركز فيها المرض عند دور التركز اذا ما ترك المريض وشأنه وهذا الدور يختلف زمنه من عشرة أيام الى ٣٠ يوما فيستقر أما فى الرئتين أو احداهما أو فى المفاصل وهى قليلة الحصول . وفى نسبه كبيره من المرضى تتحسن الحالة تدريجيا وبشكل بطىء فيستمر النزال زمنا طويلا وربما يستمر مع المريض ارتفاع

قليل فى الحراره مابين ٣٧ر٥ درجه الى ٣٨ مساء وفى نسبه مئويه يظهر التحسن بوضوح وبشكل ظاهر دون أن يترك وراءه أى عارض أو علامه .

اللهم الا اذا كان هناك أى ظل يشتبه فيه عند الكشف بالأشعة المجهولة فعندئذ يجب اعطائه نصيبه من العنايه حتى يزول بالراحة أو بغيره من العلاج الناضج ولسهولة التشخيص بينه وبين الحمى التيفودية يجب تكرار فحص الدم مرتين أو ثلاثة فاذا كانت سلبية مع عدم ظهور الطفح الجلدى المميز للتيفود وعلامة اللسان التيفودى وهو أن يكون محمرا فى أطرافه وفى وسطه وابيض فى باقى اجزائه حينئذ يجب اعتبار الحالة حمى درنية . ولزيادة التأكيد يزرع الدم للتثور على ميكروب الدرن بطريقة العلامة لونشتين ولاهميتها نشرحها فيما يأتى :—

طريقة لونشتين : يؤخذ ١٠ سنتيمتر مكعب من دم المريض بواسطة حقنة زجاجية ويمزج معه مقدار ٢ سم مكعب من محلول ٥ ٪ من سترات السودا المعقم ثم يرسب بواسطة المرسب الدائر ويؤخذ الراسب وتضاف اليه ٥ ٪ من محلول حمض الكبريتيك المعقم لتكسير الخلايا الدموية الحمراء ثم تغسل الراسب بماء معقم . ومن هذا الراسب يزرع عدة انابيب من مخلوط لونشتين وتراقب الأنابيب من ٣ أيام الى عدة اسابيع ويبحث عن الميكروب الدرنى الذى فى أغلب الاحيان يتحول من شكل الباسيل الى شكل حبيبى يأخذ اللون الاحمر مع الكاربل فكسين وعلى ذلك يجب العناية والاهتمام بأى شكل من هذا النوع اذا لم يعثر على الباسيل العادى المعروف وهذه حسب ابحاث العلامة كارواشى البولندى التى القاها فى مؤتمر السل الدولى وكان لى شرف الاشتراك فى جلساته العلمية فى بولندا .

العلاج : يتحتم البدء فى العلاج عند حصول اى اشتباه وعدم انتظار ورود نتيجة الفحص معيا

وراء ايقاف المرض قبل دور التركز أو الاستقرار وقد وجدت مركبات الكولين مثل بانكسيلون أو حقن دينافون من انجح العلاجات كما ان اعطاء مسحوق الكلوميل بمقدار صغير من سنتيجرام واحد أو اثنين مروجا بلبنات الجير هو في الواقع اول علاج اكتشفته لهذا المرض اما بعد المؤتمر الدولي التاسع للسل فقد انجبت ابحاثي فيه عن مركب حقن الفاروكين وهي في عنصرها تحتوي على قليل من الزئبق والجير والكافور . وهو سريع التأثر على سير حمى السل فتخفضها سريعا من اول حقنة وريدية . ويحسن اعطاء المريض بعض مركبات الكلسيوم مع الفتيامين (د) بطريق الفم من نصف قرص الى قرص مرتين يومياً . .

انظر الكلشيه بعد دور التركز على صفحة « ٤٥ »

الالتهاب الفصي الدرني

وهو نوع من الأورام الدرني الذي يصيب فصاً من فصوص الرئة بأكمله وتكون العدوى محدودة بقاعدة الفص من اسفل ومنتشرة الى قمة الفص وغالبا ما تكون سببا حمامات الشمس المبالغ فيها وقد وصفت الملاحة سرجنت الفرنسي مثل هذه الحوادث بعد رجوع المرضى من شواطىء البحر حيث اكثروا من الحمامات الشمسية .

لهذا وجب تحذير المصطافين دراما من المغالاة في اشعة الشمس وحرها وان لا يعرضوا اجسامهم اكثر من ربع ساعة يوميا ولا يصلوا لهذا المقدار الا تدريجيا خمس دقائق في أول يوم وثاني وثالث يوم ثم ٨ دقائق او عشر في رابع يوم وخامس يوم ثم اثنى عشر دقيقة في

سادس يوم وهكذا حتى يصلوا الى الربع ساعة بعد عشرة ايام نصفهـا على مقدم الجسم و نصف الوقت الباقى على الظهر .

واعتقد أنه بهذا النظام يمكن الأستفـادة من الشمس بدلا من أصابة الرئة بخطرها وهو ظاهر فى الصورة .

يظهر فى هذه الصورة التهاب درنى فى كل الفص الأيمن الاعـلى وفى وسطه كهف غير صغير ظهر بعـد شهر من المعالجة بأشعة الشمس قرب البحار .

الاسباب المباشرة لانتقال العدوى

الرضاعة : كثيرا ما تنقل العدوى من الحيوان للانسان بطريق اللبن الذى يؤخذ من الابقار المريضه دون تعقيمه بالحرارة وغليه على النار وهذا الميكروب يصيب الأطفال فى الغالب عند تناولهم هذا

اللبن الغير معقم ، ويميل دائما ميكروب سل البقر عند انتقاله الى الانسان الى اصابة الغدد الصدرية أو غدد البطن او الرقبة ويمكث فيها زمنا طويلا كامنا حتى يتيح له الظروف بأن يفقد غلافه الشمعى عند حصول احتقان حوله كما نرهنا سابقا حسب تجارب العلامة كارواشى ويتحول الى الفائق فى الصغر Ultra-Virus وهذا ينقل الى الدورة الدموية ومع الزمن يصيب الرئتين أو غشاء المفاصل أو البريتون وهو الغشاء المبطن للبطن .

اضف الى ذلك ان هذا النوع من الميكروب قابل للمرور فى المرشح وعليه يمكنه المرور عبر خلايا المشيمة اثناء الحمل من الأم الى الطفل حيث يصيب الغدد اللمفاوية ويمكث كامنا فيها حتى تؤهل له الظروف الاستقرار فى الرئة عند ضعف المقاومة أو اسبابها كذلك يمكنه المرور عبر الغشاء البلوراوى ولذلك تجده داخل سائل الارتشاح البلوراوى ويمكن التأكد بواسطة حقن قليل من السائل الى الأرنب الهندى وبدون هذه الطريقة لا يمكن القول بأن هذا السائل خال من ميكروب الدرن لأن طرق الفحص العادية سواء طريقة الترسيب أو الطريقة المباشرة لا يمكن بحال ما اثبات وجود باسيل الدرن بشكله العادى ولذلك يجب دائما التريث فى تفسير النتائج السلبية لان الخطر كل الخطر فى اعتماد المريض على نتيجة الفحص السلبية وترك نفسه دون علاج أو دون اعطاء جسمه قسطا أوفر من الراحة والتقوية بالفيتامينات المزوجة بامتلاح الجير أو « الكلسيوم »

التقبيل : كثيرا ما تصاب الام بعد ولادتها بالمرض فيجب ان تتحاشى تقبيل ابنها تماما فى فمه منعا للعدوى وكثيرا ما نشاهد مريضة احدى صديقاتها حتى تسرع اليها معانقة ومقبلة ناسية ان فى ذلك نقل الميكروب الى صديقتها دون قصد . فحبذا لو حاذر كل شخص من هذه العادة الذميمة ، ويجب على الشخص السليم عندئذ المبادرة الى غسل وجهه بالصابون أو تطهير وجنتيه

بقطنة مشبعة بالكحول .

الطعام : ينتقل الميكروب بواسطة الطعام .

(اولا) أن عادة البصق فى الطرق منتشرة بين الناس لدرجة أن الغبار الذى تنقله مكنسة رجال التنظيم

تبين هذه الصوره كيف ان الميكروب ينتقل من صاق المريض المبصوق على الارض الى الخضر والفواكه بواسطه مكنسة عمال النظافه

الى محلات الفاكهة وبائعى الخضروات كاف لنقل العدوى أن لم تغسل الفاكهة قبل تناولها مهما يكن من نية تقشيرها قبل اكلها فان اليد التى تلمسها قبل تقشيرها تنقل ما علق على غلافها اليها بعد التقشير .

(ثانيا) كثيرا ماترى المدعوين الى وليمة فى الارياف وغيرها يتناولون الطعام من طبق واحد تغمس فيه ملاعقهم المختلفة وحيث انه كثيرا ما يكون حامل الميكروب خاليا من السعال ولا يشكو من البلاغم الا فى الصباح فقط فعلى ذلك لا ينتبه اليه مجاوريه وبهذا السبيل كثيرا ما تنتشر العدوى .

(ثالثا) كثيرا ما رأينا الام وهى تتذوق طعام طفلهـــا قبل مناولته اليه لتطمئن الى سخونته أو طعمه . ثم تطعم طفلها بنفس الملعقة بعدئذ وفى هذه الحركة ما يكفى لنقل العدوى .

(رابعا) كثيرا ما نرى اعضاء اسرة واحده يتناولون الطعام مع مريضهم ويشربون من الوعاء الذى يشرب منه غير آبهين للعدوى متكلين على قوة بنيتهم بانها سوف تحول دون العدوى ولكن تطورات ميكروب الدرن التى فصلناها سابقا تدل على قوة هـــذه الجرثومة وانها صعبة الشكيمة : لذلك يجب على أفراد الأسرة أن يخصصوا لمريضهم كوبة مميزة وملعقة وطبق يختلف فى

شكاه عن بقية الاطباق كما يجب أن يخصص له غرفة خاصة وسرير خاص . كذلك يجب غسل ملابسه لوحدها وعدم خلطها بملابسهم عند غسلها .

جلس أفراد العائلة يأكلون من طبق واحد وقد أهملت الأم المريضة ملعقة ابنها فأخذت تطعمه بملعقتها مع ما فى ذلك من خطر على الابن وباقى الأفراد .

(خامساً) وضع القال فى الكتاتيب أو المدارس الاولية ليتناولها التلاميذ الواحد بعد الآخر سيما وأن هذه الأوانى يصعب غسلها لكبر مسامها وتراكم الميكروبات والجراثيم فى هذه المسام سيما ميكروب الدرن الذى يتوالد بكثرة فى مسام هذه المواد الخزفية فتنتقل من التلميذ الى الآخر وفى ذلك ما فيه من الخطورة فى انتقال العدوى كذلك تكون هذه الاوانى الخزفية نفسها موضع عدوى للأفراد عند وضعها للرائح والغادى على الطرق العامة .

السعال : يكون السعال وثير الميكروب المتطاير فى رذاذه سبيلا للعدوى بين التلاميذ عند

التحادث واقتراب وجوههم بعضها من بعض كذلك فى المحـلات العامة والمزدحمة مثل دور السينما والملاهى : وكثيرا ما تنتقل العدوى من المريض الى الممرضة فى المستشفيات عن طريق اليد ولمس حاجات وأوانى المرضى .



الاسباب الغير مباشرة للعدوى

فصلنا الاسباب المباشرة للعدوى سابقا أما الغير مباشرة فهى ما نسميه بالاستعداد الشخصى أو قابلية الشخص للعدوى عند اقل تعرض له — وقـد لاحظ العلماء قديما انه يميل لاشخاص صدورهم ضيقة وطويلة أو الاشخاص المشعرين . وقد لاحظ الاطباء أن المرض كثيرا ما يترك الابناء ليصيب الاحفاد أو ابنائهم ولذا كانت عنايتى متجهة لمعرفة اسباب هذه الملابسات والظروف فاتخذت لى خطة فى فحص كل مريض بأتى لعيادتى وهى أن افحصه من اخمص القدمين لقمة الرأس باحثاً عن علامات مميزة سواء فى الاسنان أو تركيب العظام أو تغيير أشكال وتقوسات الرأس وشكل الانف أو ما يسمى بالاستجما « Stagma » فوصلت الى ما يأتى : —

فى ٤٥ ٪ من مرضى السل وجدت عظمة الساق محببة فى حافتها الأمامية فى كلها أو جلها وكثيراً ما تصل الى الثلث أو اكثر كذلك وجدت بعض الانتفاخ السيفى المعروف ومع هـذه العلامة بعض العلامات المميزة القادمة

فى ٢٥ ٪ وجدت تصلب فى شرايين المريض أو تضخم فى الاورطا أو القلب أو كبر الشريان الرئوى بجانب القلب مع بعض العلامات السابقة أو اللاحقة

وفى ١٥ ٪ وجدت تغيير فى أشكال الجمجمة أو الأنف أو الشفة المسماه بشفة الارنب أو أسنانه المبردة (شكل المبرد) واسنان هتشنسون أو نقص فى عددها سيما نقص الانياب أو زيادتها .

و١٥ ٪ لم يوجد اى علامة فى المرضى مميزة مما سبق ذكره انما وجدت علامات فى اخوتهم أو اخواتهم أو اولادهم .

وعلى هذا الاساس ابتدأت اعالج الاطفال من سن الخامسة الى العاشرة بمستحضرات الزئبق والبزموت او الزرنيخ لكى امنع عنهم هذا الاستعداد الشخصى لعدوى السل فوجدت أن اخفهم تفاعلا هو الزئبق ويتحملونه بسهولة عن بقية المستحضرات سيما اذا مزج ببعض املاح الجير أو الفيتامين «د» فلا يلبث الطفل طويلا حتى تتحسن صحته ويمتلىء عافيه من أول مجموعة من الحقن لا تزيد عن ١٢ حقنة ولا تقل عن نصفها .

وبعد ابحاث طويلة وفقت الى مركب يحتوى على هـذه العناصر مضافا اليه عنصر املاح الكافور ذات التأثير المنعش الفعال على الشرايين والقلب وهما فى معظم المرضى يكونا متأثرين بتأثير سموم المرض حتى فى أول ادواره وهذه الظاهرة قد بينتها فى بحث قيم القى على هيئة المؤتمر السابع للجمعية الطبية سنة ١٩٣٣ ووصفت كيف ان الامتصاص من اصغر بؤرة درنية يؤثر على عضلات القلب ومن جهة أخرى على الضغط الدموى فيهبط هبوطا ملموسا ويترتب على هـذين العارضين القاق الليلى وضعف النوم كما يحصل فى مرض ضعف القلب .

وقد كانت النتائج التى حصل عليها المرضى بواسطة هذا المركب المسمى بالفاروكين فى العشر سنوات الماضية مشجعة للغاية .

وقد اهتم الكثيرون من علماء الصدر فى اوربا بعلامة هبوط ضغط الدم وعلقوا عليها أهمية كبرى فى إنذار المرضى خصوصا فى الارتشاح البلوراوى . فاذا كان الضغط معتدلا أو عاليا نوعا كان علامة حسنة فى سير المرض وشفاء المريض . أما اذا كان الضغط هابطا دون التاسعة للانقباض كان علامة سيئة على سير المرض وشفاء المريض . ولهذا كانت حقن الفاروكين اكبر مساعد فى رفع ضغط مرضاى وشفائهم من السائل البلوراوى مع العلاج وسنرجع لهذا الموضوع فيما بعد .

وقاية الرئة عن طريق البلورا

أن البلورا هو الغشاء المبطن للتجويف الصدرى ويغطى الرئة كذلك من داخل التجويف وهو يلعب دوراً هاما فى حفظ الرئة . كما أن طريقة علاجه تلعب دوراً أهم واعظم فى وقاية الرئة من مرض التدرن ولذلك وجب على أن افرد لهذا الموضوع فصلا خاصاً نظراً لأهميته .

فى التهاب البلورا :

حينما يصاب المريض بتضخم الغـــدد حول القصبة الهوائية ويسرى الامتصاص المرضى بواسطة القناوات الليمفاويه من هـذه الغدد الى الغشاء البلوراوى يحصل تفاعل حميد فى البلورا وهو الارتشاح السائلى فى داخله ويكون مصحوباً بارتفاع فى الحرارة وضيق وسرعة فى التنفس مع فقد الشهية وألم فى الجانب (الخاصره) ولهذا سمى بداء الخاصرة أو داء الجنب وهذا التفاعل الطبيعى هو فى صالح المريض حيث يؤدى وظيفة عمليـة تطبيق الرئة أو (الاسترواح الصدرى) لا راحة الرئة من عملها بواسطة ضغط السائل عليها وتطبيقها حتى مع الوقت تزول الاسباب التى أدت الى هذا التفاعل وهى تضخم الغدد الدرنية ثم بعد ذلك تزول النتائج وهى الارتشاح البلوراوى

وكانت النظرية القديمة تقول باراحة المريض بزل هذا السائل وفى هـذا الخطر كل الخطر لأنه بانفراج الرئة يعد بزل السائل ترجع الرئة لعملها مع ما فى ذلك من التعب والانهاك على رئة متعبة نوعا وتهييج للبؤرة الموجودة حول الشعب وبهـــذا تنفتح السبل من جديد أمام القناوات الليمفاوية التى كانت تطبعت بواسطة وجود السائل فى البلورا ويسهل انتشار العدوى فى جميـع الرئة وقد حضر لعيادتى عدة حالات من هذا القبيل بسبب بزل السائل بمعرفة أطباء يدينون بالنظرية الخاطئة القديمة وكانت النتيجة اصابة الرئة بسل مستعجل اودى بحياة المريض بعـــد زمن قصير .

لهذا يجب ملاحظة أمرين مهمين فى علاج السائل البلوراوى :—

أولا :— ترك السائل يمتص تدريجياً ووضع المريض فى فراشه وعلاج الرئة والسائل معاً لأنه من العبث علاج المرض وترك السبب فى الجهاز الليمفاوى وهـذا يعالج باعطاء المريض مستحضرات زيت السمك والجير مع الكافور أو الفاروكين مرة على الاقل فى اليوم واذا سمحت حالة المريض فيعرض مرة فى الاسبوع للاشعة فوق البنفسجية ومع الضرورة تعمل له الدياثرنى لمدة عشرة دقائق كل بضعة أيام وهذه الطريقة ناجحة للغاية ويستعملها الاستاذ الدكتور برسى هول بانجلترا ويستحسن فحص المريض بالاشعة X لمعرفة درجة زوال السائل وقد رأيت مريضا عمل له مرة واحدة الاشعة فوق البنفسجية لمدة عشرة دقائق فزال منه السائل بتاتاً وقد اعطى فى نفس الوقت اقراص الجير الفوارة قبل الاكل ومستحلب زيت السمك الجيرى بعد الاكل .

ثانياً :— ملاحظة المريض بعد شفائه من السائل لمدة سنتين واعطائه نصائح عـدم السهر والابتعاد عن الاعمال الشاقة أو الحمل ان كانت سيدة لمدة بضعة سنوات حتى تتقوى الرئة ويتم تكلس غددها التى سببت الاصابة .

العـــلاج

« العلاج الجيد وسيلة قوية من وسائل الوقاية »

أن طرق العلاج العديدة لمرض السل تدعونى لشرحها واختيار أحسن الطرق لمختلف المرضى لأن كل مريض يختلف فى علاجه عن غيره من حيث تقدم المرض واختلاف درجاته . وأن شفاء المريض هو أكبر رحمة يجدها أهله ومخالطيه فى اتقاء خطر الميكروب الذى ينفثه المريض بينهم قبل شفائه .

والعلاج لمرض السل ينقسم الى قسمين (ا) العلاج الطبى (ب) والعلاج الجراحى وقد أفردنا لكل منهما فصلا مستقلا .

العلاج الطبى

ينقسم العلاج الطبى الى (١) العـــلاج المصحى (٢) حقن الذهب (٣) حقن الفاروكين (٤)مركبات الكولين والحقن الجيريه وهـذه تعطى فى الوريد أو فى العضل وقـد خص العلماء مستحضرات الكولين بكثير من الاهتمام وعلقوا عليها أهمية فى عـــلاج الغدد الدرقية (٥) مستحضرات زيت السمك والفيتامين « د » .

المصحات

القصد من علاج المصحات هو اعطاء المريض فرصه ليتمتع أولا باقصى ما يمكن من الهواء النقى والضوء الشمسى المشبع بالأشعة فوق البنفسجية والذى يحوى على أقل كميـــة من الاشعة الساخنة وهى الاشعة تحت الحمراء الموجودة بكثرة فى المناطق الحارة ولذلك حض العلماء على

بناء المصحات فى اكثر بقعة ارتفاعا عن سطح البحر حيث تقل فيها الاشعة الحرارية كذلك حضوا على أن تحاط باراض زراعية أو قرب البحيرات حتى تنعدم الاشعة الحرارية آنفة الذكر لأن هذه زيادة على أنها تضايق المريض فانها تضعف مقاومة الجسم وتميت بطريق التعادل الأشعة فوق البنفسجية الموجودة فى الجو والتى لا غنى للجسم عنها اذ بها تثبت املاح الجير الموجودة فى طعام الانسان الطبيعى مثل اللبن والخضروات فيستفيد الجسم منها وعلى ذلك تشتد مقاومته للعدوى ثانياً . أضف الى ذلك أن المريض فى المصحة يتمتع بالراحة التى هى ركن كبير من اركان شفاء مرض السل . ولاهمية الراحة فى العلاج المصحى وجب على أن ابين درجاتها ومدى اختيار كل درجة وقد قسمها علماء الصدر الى سبعة درجات .

الدرجة الأولى : هى الراحة التامة وتتلخص فى الاستلقاء على الظهر ويمنع المريض من أى مجهود جسمانى أو عقلى . فيمنع من جانبه أى ترابيزه جانبيه حتى لا يتناول بيده أى كوبة ما أو أى شىء فيترك المعرضه مساعدته فى كل ذلك ويمنع من القراءة والكتابة والكلام والزائرين حتى لا يتعب أعصابه فى الاستماع الى أى خبر أو قصة .

الدرجة الثانية : وهى مثل الأولى من الاستلقاء التام ومنع القراءة والزيارات ولكن يسمح له بأن يتناول بنفسه كوبة الماء الموضوعة بجانب السرير وتساعده المعرضه على غسل وجهه ويديه وعلى التبرز والتبول وهو مستلق على ظهره .

الدرجة الثالثة : راحة تامة فى الفراش مع السماح للمريض بوقت قصير بين الاستلقاء والجلوس ويزيد هـذا الوقت تدريجيا ويسمح له بالقراءة والزيارة والكتابة بأوقات مدرجة ويستمر على التبرز والتبول كالدرجتين الاولتين .

الدرجة الرابعة : يسمح له بالجلوس فى الفراش للاكل ولغسل وجهه ويديه ويسمح

للزائرين بوقت أطول وباقي الوقت مستلقي على ظهره مع التبرز في الفراش .

الدرجة الخامسة : مثل سابقتها انما يسمح له بالجلوس على كرسي طويل لمدة نصف ساعة مرتين يومياً ولا لزوم للتبرز في الفراش ولكن بجانبه وهـذه الدرجة توصى بها في الارتشاح البلوراوي وفي اصابات الرئة الخفيفة .

الدرجة السادسة : مثل السابقة ويسمح له بالذهاب لدورة المياه .

الدرجة السابعة : راحة في الفراش مثل سابقتها انما يسمح له بالذهاب الى الحمام ثم يدرج على المشي والرياضة وللعمل البسيط .

وفي انتخاب درجة الراحة للمريض يجب اذا كان هناك ارتفاع في الحرارة وضرورة قصوى للدرجة الاولى من الراحة كما في النزيف الشديد عـدم البدء بها مباشرة حتى لا يصاب المريض بصدمة عصبية فتسوء حالته ويفقد ثقته في العلاج والطبيب بل يجب البدء بالدرجة الثانية أو الثالثة من درجات الراحة وينتظر لمدة اسبوع مثلا فاذا وجدت غير كافيه تشرح المسألة للمريض ويرجع للدرجة الاولى من الراحة وهذه سريعة الفائدة اذ تنخفض الحرارة بعد اسبوع من الالتجاء اليها ويستمر على الراحة بعد انخفاض الحرارة وقتاً كافيا وهو بين الشهر والشهرين .

واذا كانت الراحة غير كافيـة بعد اسبوعين فيجب الالتجاء لوسائل اخرى من العـلاج مثل حقن الكولين او البنكسيلون حتى تزول الحرارة .

واذا فحص المريض بالاشعة بعد شهرين ولم يوجد في الاصابة تحسن أو وجد النبض سريعاً رغما عن أن الحرارة اصبحت طبيعة فيجب الاسراع بعمل حقنة الهواء لتطبيق الرئة وهي احـد العلاجات خصوصا اذا اختيرت في الوقت المناسب اى قبل أن تصاب الرئة الاخرى والا وجب

تطبيق الرئتين على السواء وفى هذه الحالة تعطى الرئة الاكثر اصابة كمية من الهواء اكثر من الكمية التى تعطى للرئة الاقل اصابة وأن يكون الضغط فى التجويف الصدرى دائما سلبياً والا تعرض المريض لمضاعفات مثل حصول انسكاب بلوراوى وهذا ربما يتقيح فيعرض حياة المريض للخطر . وحصول التقيح هنا ينشأ من حقن الهواء المستقبلة لأن الهواء كثيرا ما يكون حاملا لميكروبات التقيح (العنقودى) .

وتعمل الحقن الهوائية فائدتها اولا بتطبيق التكهف ويضغط الهواء لايجاد حوائط التكهف فى حالة التصاق وتقارب وبذلك يسهل اندمالها وشفاؤها على عكس ذلك عند وجود حوائط التكهف متباعدة يسهل تراكم البصاق فيها وهذا بدوره يساعد على اتساعها وعدم التحامها ثانياً عند وجود الهواء فى تجويف البلورا تمنع الرئة من تمددها فى حالة الشهيق وعلى ذلك يقل عملها ويكون الهواء كدعامة تستند عليها الرئة وترتاح بواسطتها وعلى أساس هذه الراحة تساعد الاحتقانات والارتشاحات الرئويه على الامتصاص وزوالها من نفسها . وقد شبهه بعض علماء الصدر فى عمله كعمل الجبيره فى كسور العظام وهذا العمل هو نفس العمل الذى تتطلبه الطبيعة من السائل البلوراوى فانه بعمل عمل الجبيره على التحام ما تحت السائل وامتصاص الارتشاحات فى الاوعية الليمفاوية والغدد الليمفاوية تحت السائل وقد نبهنا سابقاً بعدم بزله بل بتركه بحف لحاله مع العلاج الناجع .

والعلاج المصحى له مزايا عديده . فهو خلاف الانتفاع بالهواء الذى المشبع بأشعة الشمس والراحة والملاحظة اليومية بواسطة الطبيب الاخصائى فان له ميزة كبرى وهى راحة اعصاب المريض من الزائرين المتكلفى القلق على سلامته ـ وكذا من قراءة المشخرلية واضطراب افكار

أهله على وجوههم فهذه تجعله يتقهقر فى علاجه ويسوء من سيء الى أسوأ اذا ترك فى منزله اما فى المصحة فانه يسير سريعا نحو الشفاء .

واختيار درجة الراحة تتوقف على درجة الحرارة وسرعة النبض وباقى الاعراض الاخرى مثل درجة النزيف وغيره وهنا نقول انه يستحسن عنـــد وجود النزيف الحاد والغزير أن يوضع المريض فى درجة الراحة الاولى أو الثانية .

ومع العـلاج المصحى تتقوى الحركة الدموية من الراحة والهواء النقى خصوصا وان القلب يكون متأثراً من قبل ، أولا بامتصاص سموم المرض ، وثانيا بارتفاع الحرارة ، وثالثا الاضطراب العصبى وحالة القلق المحيطة بالمريض تجعل القلب فى حالة سريعة وعليه يخف العمل عن القلب فى المصحات لوجود المريض فى جو هادىء وبعيد عن ضوضاء الشوارع وبذلك تتقوى عضلات القلب وهذه بدورها تساعد فى امتصاص الارتشاحات الرئوية .

وفى المصحة يجب فحص المريض بالاشعة النظرية مرة كل شهر على الاكثر لمعرفة تحسن الحالة وسير المرض كما يجب عمل صورة للمريض كل ثلاثة أشهر على الاكثر ومقارنة الصورة الاخيرة بالصورة التى سبقتها واذا كانت الافلام قليلة كاوقات الحرب مثلا فيكتفى بالرسم الكروكى على كراسة المريض لدرس حالته من وقت لآخر عند المرور عليه .

والسولاريوم يكون جزءا من المصحة وهو عبارة عن صالة كبيرة غير كاملة ذات حائطين أو ثلاثة حتى يتمتع المريض بالهواء الطلق الغير عنيف (الناعم) وبحيث يبنى هذان الحائطان بنظام يمنع الرياح ويسمح لأشعة الشمس بزيارة أرض الولاريوم أقصى فترة من النهـــار وبحيث لا تلامس الاشعة المباشرة اجسام المرضى .

جلست احدى الممرضات لتعلم بعض الاطفال الذين تسمح حالتهم دروسا قصيرة تعوض عليهم ما فقدوه فى مدارسهم

وقد اعتاد المهندسون على جعل فرانـدات كبيرة بجانب غرف المرضى فى المصحة ويوضع فيها الاسرة وقد جعلت ذات نوافذ كبيرة أو جعل فى الجهتين الخاليتين حوائط متحركة بحيث تنزل عند هبوب الرياح وترفع عند اختفائها وبحيث أن المريض يوضع فيها ليل نهار من لا تسمح



حالتهم بالانتقال من الفراش الى الفرانده وبالعكس وممن يكون مفروضا عليهم اقصى درجات الراحة المذكورة سابقاً .

ولا يخرج المريض من المصحة حتى يمرن تدريجيا على الرياضة وبعض العمل رويداً رويداً حتى يعتاد جسمه على الحركة وان كان ذا حرفة شاقة فيجب النصح له بالابتعاد عنها والسعى له بحرفة سهلة لأن الحرف الشاقة المصحوبة بالركض وحمل الاثقال هى فى الغالب مدعاة للنكسة وهناك الطامة الكبرى على صحته اذ يذهب تعب اطباء المصحة والمصاريف التى تكبدها أو تكبدتها الحكومة عليه هباء منثورا — وأن أنس لا أنسى مريضا مكث فى المصحة وقتا غير قصير وعملت له عملية جراحية لقطع عصب الحجاب الحاجز وقد شفى تماما من مرضه ثم رجع الى مهنته الشاقة وهى حراسة السيارات فى الشوارع وكان لابد له من الجرى وراء عملائه وان يدفع بجسمه بعض الاتومبيلات لكى يوسع لغيرها محلا وكان عليه أن يبذل مجهوداً غير قليل ثم يسهر فى حراسة السيارات وقد نصحته بأن فى هذا الخطر كل الخطر فلم يأبه له وكانت

النتيجة انه فى ظرف سنة كان مقضيا عليه .

هذا وجه العلماء اهمية كبرى لما سمى « بالعناية بعد العلاج » وهى ملاحظة المرضى بعد شفائهم لمدة سنة أو اثنين ومدهم بالنصائح والمساعدة المالية ان طالت حتى يدوم معهم الشفاء ويتركز على أساس قوى بحيث لا يعاوده المرض واذا كان هناك اى عارض مثل ارتفاع قليل فى الحرارة بعد الظهر فيجب ابعاده عن عمله مدة اسبوعين أو اكثر ووصف العلاج اللازم لهذا التفاعل محقن الجير أو مركبات الكولين مع بعض مستحضرات زيت السمك ولكن أهمها الراحة وتغيير مقدار ساعات العمل أو تغيير نظام معيشته .

العلاج بأملاح الذهب :

كان أول ما استعمل من مركبات الذهب هى حقن سانوكريزين وقد اكتشفت فى الدانمرك ثم بعد ذلك عمل الفرنسيين حقن كريزالبين فى الوريد وفى العضل مذاباً فى مادة زيتية وظهرت مركبات سوجانال واحسنها ماكان زيتياً ولغاية الآن لا يفضل عليها أى مركب آخر لسهولة استعماله ولعدم حصول رد فعل منه سيما اذا عمل بمقادير صغيرة فى الأول ثم زيدت تدريجاً كل يومين أو ثلاثة حقناً فى العضل . وهذا العلاج لا يقدم عليه الا اذا كانت حرارة المريض طبيعية ومضى عليه شهر على الاقل بدون سخونة . فهو خطر جداً اذا كان حرارة المريض غير طبيعة اذ به تزداد الحرارة ارتفاعاً ويزيد المرض احتقاناً فى الرئة . وعلى ذلك لا يجب استعمال املاح الذهب مهما كان المقدار صغيرا فى حالة انحراف الحرارة عن الحيز الطبيعى .

ويقل البلغم والسعال وتتحسن حالة المرضى من استعمال السوجانال ويأخذ المريض عاده من ٣ — ٤ جرامات فى المعالجة وقد دلت التجربة أن التحسن من العلاج به غير ثابت فهنالك

تكسبات بعده ولذلك يجب التكشف على المريض كل ٦ اشهر بالاشعة حتى اذا لزم الأمر يتكرر مرة أخرى .

ويلتجئ الطبيب لحقن الذهب اذا لم تفلح حقن الهواء بسبب وجود التصاقات فى البلورا تمنع من تطبيق الرئة المصابة أو كانت الاصابة صغيرة أما اذا كانت أصابه الرئة كبيرة مثل كهف كبير أو ارتشاح يملأ نصف الرئة فحينئذ يجب اختيار طريقة أخرى أرجح من ذلك سنذكرها فيما بعد تحت العلاج الجراحى . ويجب فحص بول المريض أثناء العلاج بأملاح الذهب حتى اذا وجد زلال يوقف العلاج حتى يزول .

العلاج بحقن الفاروكين :

اكتشف هذه الحقن المؤلف فى سنة ١٩٣٧ ونشرتها المجلات العلمية وهى تتكون من حقن وريدية مكونة من أملاح الكافور والجير ممزوجا بجزء يسير من سيانور الزئبق يبلغ نحو ½ الميلجرام ويمكن أن يزاد الى ١½ ميلجرام تدريجيا مع التحسن واختفاء السعال من المريض .

وهذه الحقن ذات تأثير فعال على السل فى أول درجاته مثل التصدد الدرنة والنزلة الشعبية الدرنية Peribronchitis وألالام الصدرية الدرنة والحمى الدرنية الشبيهة بالتيفود .

وعلى سبيل المثال : نذكر بعض الحالات :

١ . م تشكو ألام صدرية منتشرة على الجنب الايمن من الصدر وتنعكس ايضا على الجنب الايمن من البطن وكذا على الجنب الايمن من الظهر وقد مضى على ذلك نحو سنة ونصف بدون فائدة من العلاجات الأخرى فأخذ ٦ سنة حقن شفى من بعدها تماما .

ج . س . تاجر : نزيف من وقت لآخر مع بلغم وقد عولج اولا بحقن الذهب مع الجير بدون فائدة فأخذ ٥ حقن من الفاروقين وكان تأثيرها ساحرا فى اختفاء البلغم وتوقف النزيف.

ج . ف . صائغ . س ٣٥ يشكو من سعال متكرر من عشر سنوات وكانت صرة الرئة اليسرى كبيرة بالكشف بالأشعة وحولها بعض الارتشاح وكان السعال ينتابه كل عشرة دقائق وقد أعطيته حقنة وريدية واحدة مخففه بخمس سنتيمتر من الكلسيوم فاختفت الكحة ٥٠ ٪ ثم حقنة أخرى فقلت الى ٣٠٪ ثم استمر على التحسن هكذا وقد شفى تماما فى ٣٠ يوما تقريباً .

م . م . عمرها ٢٥ سنة تشكو من هزال وسعال جاف وبالكشف عليها وجدت صرة الرئة اليسرى كبيرة أخذت ٦ حقن وبالكشف بعد ذلك بالأشعة وجدت الحالة طبيعية .

من هذه الأمثلة يتضح عظيم فائدتها فى الادوار الأولى من المرض الا أن حالات التكهف والارتشاحات الكبيرة لا يفضل شيء فيها على حقن الهواء أو العلاج الجراحى ولربما نستطيع مع الوقت ومع تحسينها ان نعم فائدتها بعونه تعالى الحالات المتقدمة ايضا .

العلاج بالحقن الجيريه (الكلسيوم)

ان استعمال الجير فى دور النقاهة لا يمكن الاستغناء عنه بعد شفاء المريض وخروجه من المصحة ويجب أن يستمر عليه زمنا طويلا وقد تفضل عليها حقن الجير مع الفيتامين أذا كانت الحرارة طبيعية منذ زمن مضى والكلسيوم لا يؤثر بتاتا على مرض الصدر انما يحسن الحالة وقوة المقاومة وبذلك تستطيع أن يتقى الامراض الطارئة مثل الأنفلونزا والبرد والزكام الذين قد يثيرا المرض الكامن مرة أخرى . ولا يجب الاعتماد على هذه الحقن فى شفاء المرض وقد رأيت حالات كثيرة تستعمل هذه الحقن مدة ٦ ستة شهور دون استشارة طبيب اخصائى . ينبرهم

وبذلك يفقدون فرصة ذهبية من ايقاف المرض فى وقته وعلاجه فى حينه لأنه رغما عن تحسن لون المريض وحالته العامه فان الحالة المرضية تستمر على ما هى عليه وربما يتسع الكهف أو ينتشر الى الرئة الثانيه فيضطر الطبيب للالتجاء لطرق أخرى من العلاج اكثر من الاسترواح الصدرى .

أما العلاج بحقن الكولين ومستشفاته فهو مفيد فى الحالات الخفيفة مع الراحة والعلاج المصحى فسريعا ما يساعد على خفض الحرارة وبذلك يرتاح المريض وتتحسن لديه الروح المعنوية

العلاج الجراحى

الاسترواح الصدرى — ندف عصب الحجاب الحاجز — استئصال جانب من الضلوع

القصد من العلاج الجراحى هو تطبيق الرئة أو الجزء المريض منها والوصول لأراحة هذا الجزء المريض حتى يسهل امتصاص الارتشاح الدرنى منه وكذلك تقارب حوائط الكهف . فى الاسترواح الصدرى وهو ما يسمى بارة الهواء يسعى الطبيب لأدخال الهواء فى التجويف الصدرى بين طبقتى البلورا وهو الغشاء المبطن للصدر والرئة فيعمل ضغط الهواء على منع الرئة من الانفراج وقت الشهيق وبذلك تستمر الرئة منكمشة طول مدة التنفس واذا علمنا أن الرئة تنفرد من ١٨ — ٢٠ مرة فى الدقيقة مع حركة التنفس علمنا انها تتحرك ١٢٠٠ مرة فى الساعة ونحو ٢٨٠٠٠ مرة فى اليوم الواحد ومن هذا نستطيع أن نكون فكرة عن مبلغ الراحة التى تعطيها الرئة فى هذه العملية ولذلك لا نستغرب اذا لمسنا سرعة التحسن فى المريض بتطبيق الرئة من أول يوم وفى اكثر الاحيان شاهدنا انخفاض الحرارة بعد أول حقنة وامتصاص ارتشاحات كبيرة بعد فترة قصيرة واختفاء الكهف صغيرا كان أو كبيرا بهذه العملية .

وهنـــا يجب الا يفوتنا التنويه بفضل مكتشفها والاعتراف بما لا كتشافه من الأيادى البيضاء على الملايين ممن شفوا بها الا وهو العلامة فورنالينى الايطالى المشهور .

والحذر عند تحسن المريض وزوال الاصابة من ايقاف حقن الهواء بل يجب الاستمرار فيها مدة طويلة لمدة سنة أو اثنتين وفى بعض الاحيان أكثر من ذلك وهـــذا يتوقف على كبر الكهف وصغره قبل البدء بهذا العلاج .

وتعمل الأبرة فى فترات مختلفة فبعض الافراد يحتاجون للهواء كل خمسة عشر يوما والبعض الآخر كل شهر أو اكثر وأنى استحسن اراحة الجسم اثناء العلاج وعدم الاكثار من الحمامات الساخنة لأن هذه وكذلك الحركة تساعد على امتصاص الهواء وعندئذ يضطر الطبيب الى تقصير الفترة بين الحقنتين أو لاعطاء الرئة مقادير اكثر من الهواء .

ولا يجب أن يزيد المقدار عن الثلثمائة سنتيمتر فى الصدر المتوسط أو ٥٠٠ سنتى فى الصدور الكبيرة ويجب الا يتعدى الضغط الدرجة السابعة لأن ايجابية الضغط داخل التجويف الصدرى أو كثرة الهواء تؤدى الى مضاعفات الارتشاح البلوراوى .

واذا لم يحصل تطبيق الكهف أو الجزء الذى به الاصابة كان يحصل تطبيق الجزء السليم فقط سواء كان فى اسفل الرئة أو اعلاها حينئذ يجب ايقاف التطبيق لأن هذا يؤدى الى تحميل الجزء المريض عملا فوق عمله مما يسبب زيادة المرض ، وأنتشار العدوى الى الرئة الأخرى وفى هذا كل الخطر من الاستمرار فى هذا النوع من العلاج ويجب البحث عن طريقة اخرى من العلاج الجراحى مثل تدف العصب الحجاب الحاجز أو عملية قطع جانب من الضلوع .

والفحص بأشعة X قبل وبعد حقنة الهواء ضروري اذ يبين مقدار التطبيق وصلاحيته أو عيوبه كأن يوجد التصاق رغيع مقابل الكهف يمنعه من الانقباض ونجد فى هـــذه الحالة الرئة بأجمعها منطبقة ما عدا الكهف فلهذا نبادر بعملية قطعه بالكهرباء بعد شهر مثلا أو اقل ان لم ينفصل هذا الالتصاق الخيطى من نفسه وبهذا يتم تطبيق الجزء المصاب .

وأحسن أنواع التطبيق هو ما تم بأقل مقدار من الهواء وطبق الجزء المصاب دون السليم .

وهنا يجب أن اذكر حالة رأيتها استمر الطبيب المعالج بحقن مقادير كبيرة للرئة المنطبقة ولمدة طويلة كانت النتيجة أن الرئة الاخرى تعبت من المجهود الملقى عليها وانتقل اليها المرض ولما اردنا ايقاف الهواء فى الأولى لم يمكنها من الانفراد ولبثت الرئة فى حالة انقباض تابى سببته شدة ضغط الهواء واستمراره بدون مبرر مدة طويلة .

وفى حالة عـــدم نجاح تطبيق الرئة يجب ترك حقن الهواء لأن الخطر كل الخطر فى التطبيق الجزئى وقد ثبت أن ترك الرئة وشأنها بدون حقن الهواء خير من تطبيقها جزئيا بسبب الالتصاقات الموجودة داخل البلورا .

وفى حالة وجود اصابة صغيرة فى الرئة الأخرى يجب اعطاؤها مقادير صغيرة من حقن الهواء وفى الوقت نفسه تعمل عملية ندف عصب الحجاب الحاجز للجهة التى لم ينجح فيها عملية ابرة الهواء مع وضع المريض فى المصحة واعطائه اكثر ما يمكن من الوقت فى السيولاريوم والاحتراس من تعريض المريض للشمس مباشرة خوفا من أن تسبب له ارتفاعا فى الحرارة ورد فعل تحلى فى الاصابة.

وان وجود تخانة فى البلورا ظاهرة فى صورة الاشعة يدل دلالة أكيدة على الالتصاق الكلى ولذلك يجب عدم محاولة حقن الهواء لان كل محاولة لا بد فاشلة وتعطى المريض فكرة خاطئة

عن طبيبه . لذلك يستحسن من أول الأمر الجزم بعدم فائدتها والتفكير فى غيرها من العلاجات الجراحية آنفة الذكر وأحسنها قطع الجانب الخلفى من الضلوع .

ندف عصب الحجاب الحاجز :

هـــذه العملية سهلة وبسيطة وتعمل عند وجود الاصابة فى قاعدة الرئة وبقرب الحجاب الحاجز أو اذا وجـــد الكهف بجانب صرة الرئة وهنالك تحول فروع القصبة الهوائية والشعب الرئيسية الكبرى دون انكماش نسيج الرئة حولها وتطبيقها فى عمل حقنة الهواء — لذلك نستحسن من بادىء الامر مثـل حركة الحجاب الحاجز بعمليـــة ندف عصبـــه — وبذلك يرتفـــع الحجاب بمقدار ٦ سنتيمترات أو اكثر فتتقارب حوائط الكهف ويرتاح الجزء الاسفل من الرئة وفيه يوجد الارتشاح الذى سريعا ما يمتص ويزول من العملية والحجاب الحاجز هو عبارة عن عضـــلات تفصل الصدر من البطن وتنقبض عند حركة الشهيق فاذا شلت حركته استطاعت الرئة سيما النصف الاسفل منها ان يرتاح راحة تامة وبذلك تساعد الطبيعة على امتصاص الارتشاحات والتحام الكهف .

وصف العملية : على مسافة ٣ سنتيمترات أعلى الترقوه وخلف حافة العضلة القصية الرأسية بعمل شرط مستعرض وموازٍ للترقوه بحيث لا يزيد طوله على ٣ سنتيمترات وتشد الانسجة الرخوة مع النسجة العضلة آنفة الذكر حتى مع قليل من البحث يصل الاخصائى الى العصب المرغوب ويعرف باتجاهه الى أسفل ويجب استئصال اكثر ما يمكن منه وعادة يشد العصب على جفت شريانى ويلف عليه حتى يصل الطول المنزوع من ١٠ — ١٥ سنتيمترا وهـذا الاحتياط يعمل خوفا من وجود فروع مساعده داخل التجويف الصدرى وتغذى الحجـــاب فأن لم تنزع

لا تكون العملية ناجحة تماما :- وبعد العملية ترفع رجلا السرير بوضع روافع تحتهـا حتى يساعد ضغط الامعاء والبطن فى رفع الحجاب الى أعلى ويضغط أكثر ما يمكن على الرئة وبذلك تتقارب حوائط الكهف ويسهل اندماله .

ومن ضمن الحالات التى تنجح فيها هـذه العملية وجود كهف متوسط فى قمة الرئة ووجود التصاقات حوله تمنع من نجاح حقنة الهواء وفى هذه الحالة تعمل العملية فى المصحة أو المستشفى ويجب وضع المريض فى درجة من الراحة تناسب الحالة لمدة شهرين على الاقل والا فان العملية تبوء بالفشل .

أما اذا كان الكهف كبيرا مع الالتصاقات فأن العملية المثلى هى قطع ٥ أو ٦ من الضلوع العليا المواجهة للكهف فيقطع الجزء الخلفى منها وتعمل بدون هواء حتى لا تضيع على المريض فرصة الوقت المناسب لتحمله العملية .



كهف كبير فى الناحيه العليى حوله التصاقات منعت نجاح الاستروح الصدرى ولذا عرت المريض عملية استئصال الضلوع

عملية قطع الضلوع :

هذه العملية ليست كبيرة كما يتوهم المرء فهى سهلة ويمكن عملها بمخدر موضعى (٢ ٪ من سائل اليوكايين) وتأثير العملية مدهش وعظيم النفع انما يجب اختيار أنسب الاوقات واحسن الحالات قبل أن يتأثر القلب بسموم المرض . كأن تكون البلورا تخينة أو سميكة بسبب التهاب قديم ويوجـد تحتها عـدة كهوف صغيرة أو اصابات متعددة أو كهف كبير - وفى هذه الحـالة لا يجب

تجربة حقن الهواء أو ندف عصب الحجاب بل يجب حسن اختيار الانسب الا وهي هذه العملية .

أو اذا كان السكهف كبيرا ووجدنا أن المريض لا يتذرع بالصبر وأن أعصابه مضطربه لا تقوى على تعاطى حقن الهواء مدة طويلة فيجب حينئذ مباشرة العملية فى وقتها ووضع المريض فى المصحة مع الراحة التامة درجتها الثانية أو الثالثة ويجب ملاحظة أن يكون المريض خاليا من الحرارة وأن قلبه قوى .

وفى هذه العملية يعمل القطع من الوراء بين السلسلة الفقرية وعظمة اللوح وهناك يقطع الضلع الأول بأكمله ثم يقطع الجزء الخلفى من الثانى الى السادس بمقدار ٦ سنتيمترا أو اكثر وبهذه العملية يحصل أنقباض كلى فى الجزء الاعلى من الرئة ليؤدى الغرض المقصود منه خير تأدية وفى حالات اخرى نضطر بعد شهر مثلا لاستئصال اجزاء من الضلوع الباقية حتى نحصل على تطبيق كامل لنصف الصدر .

« الاشعه فوق البنفسجيه للوقايه ولعلاج الحالات الأولى »

نوهنا عن فوائد هذه الاشعة فى مقاومة العدوى ووقاية الجسم من المرض خصوصا اذا عملت بمقادير بسيطة أى ٥ دقائق كل يومين أو ثلاثة بحيث لا يتعدى الخمسة عشرة دقيقة أو ثلث ساعة عند الجلسة الثامنة وتستمر على ذلك حتى الجلسة العشرين وبحيث تكون الحرارة طبيعية طول مدة العلاج ويمكن تكرار هذه الجلسات كل ستة شهور أو سنة حتى يسترد الجسم نشاطه المعتاد وقواه السابقة .

وهذه الأشعة أيضاً يجوز استعمالها فى شفاء حالات سل العظام وسل الحنجرة وسل الغدد فى الاطفال والكبار على السواء وكذلك فى مرض البلورا والتهابها المزمن . وهى من أحسن

العلاجات لمرض سل البريتون وكذلك التهاب الميديستينوم Mediastinum فى الصدر انما العبرة فى البدء بها بمقادير صغيرة ٥ أو ٤ دقائق مثلا ولا يجب الانتقال لوقت أطول ٧ دقائق مثلا الا بعد تعود المريض على الزمن مرتين أو ثلاث وهكذا اذا استعملت هذه الطريقة فلا يمكن أن يشعر المريض برد فعل أو ارتفاع فى الحرارة .

والمؤلف يستعمل الاشعة من خمس عشرة سنة فى الوقاية كما يستعملها فى علاج الغدد الدرنية المجاورة للشعب وضعف الصدر وهذا الاسم يطلقه الاطباء عامه عند سماع تغيير فى أصوات الشهيق أو الزفير بالمسماع كأن يكون خشنا أو أطول من المعتاد وهذه تحصل عادة من تضخم الغدد مثلا أو حصول ارتشاح فى الاوعية الليمفاوية حول الشعب الرئيسية وكذا الصغيرة . ومفعول الاشعة سريع فى هذه الحالة سيما اذا عملت معها حقن الجير فى الوريد . والمعتاد لا يزيد الوقت عن ٨ دقائق فى الجلسة مع جعل بعد الجهاز نحو ٨٠ سنتى الى متر عن جسم المريض ويجب عند حصول أى ارتفاع فى حرارة المريض خفض الزمن الى ٤ او ٦ دقائق واراحة المريض بضعة أيام بدون علاج .

وعادة يشعر المريض بعد الجلسة بانتعاش عمومى فى جسمه وتحسن فى قواه كأنه قد أخذ دواء مقويا — أما اذا أحس الانسان بعد جلسة الاشعة بألم فى الرأس وبهمود أو بخمول فيكون هذا دليلا على عدم تحمله مقدار الاشعة أذ تكون أقوى مما يجب سواء فى قربها عن جسمه أو فى الزمن .

والمعروف الآن أنه اذا تعرض سائل الكولسترول للاشعة فوق البنفسجية فانه يكتسب منها عنصر الفيتامين و وهو العنصر الفعال الموجود فى زيت كبد الحوت المضاد للامراض الدرنية إذ يجعل الجسم شديد المقاومة للامراض ويساعد على ترسيب مادة الجير فى الجسم وهذه بدورها

تساعد على الامتصاص والمقاومة والاكثار من هـذه المادة لا يؤدى العمل المرغوب منه أذ بالعكس تنقلب الى مادة مضرة بالجسم وبدلا من مساعدة تركيز الجير فى الخـلايا تنقلب الآية وتساعد على افراز مادة الجير من الخلايا أو بعبارة أخرى Decalcification وهذا ما يحصل تماما من المغالاة بالاشعة فوق البنفسجية بقرب البحار فيفقد الجسم مادة الجير ويصير الجسم ضعيف المقاومة ولهذا يصبح فريسة سهلة للميكروب وانتشار المرض فى الرئة (انظر صفحة ٤٥) وهنا نقول أن الجرعة التى يحتاج اليها الجسم من الفيتامين هى من ٥٠٠ وحده الى ١٠٠٠ وحده يوميا

وفى سنة ١٨٩٤ اثبت الطبيب الدانمركى فنسن فائدة الاشعة فوق البنفسجية فى علاج السل الجلدى وابتدأ يبنى يومئذ مجد الدانمرك فى اكتشاف معالجة هذا المرض الوبيل ولم يكن ملتحقاً بأى مستشفى أو معهد علمى بل كان مسكنه الخاص هو معمله الوحيد وابتدأ يسعى لدى أصدقائه فى بناء مصحته التى كانت اشبه بالكوخ منها بالمستشفيات والتى تحولت بعد ذلك الى المصحة الكبيرة التى تحمل الآن اسمه العظيم فى كوبنهاجن وتخليدا لذكراه قرر المؤتمر الدولى الثانى للاشعة الضوئية الذى عقد فى عاصمة الدانمرك أن يسمى كل نوع من أنواع العلاج بالأشعة الضوئية سواء كانت طبيعية أو صناعية . « العلاج بأشعة فنسن »

الوقاية فى دور التعليم

أذا قسنا جموع الطلبة والتلاميذ بالنسبة للامة واذا علمنا أن السواد الاعظم من الأمة تضمه جدران المدارس شطراً غير قصير من حياته استطعنا أن نقدر أهمية المدرسة فى درء خطر المرض عن النشء سيما وأنه أصبح من الحقائق الثابتة حصول العدوى فى زمن الطفولة أو زمن الشباب.

ولما كان النشء فى المدرسة فى دور نمو مستمر يجب أن نساعد هذا الدور ليأخذ مجراه الطبيعى بأن نوفر له فى شكل بناء المدارس أكثر ما يمكن من الهواء والشمس وان نبعد عنه وسائل الأرهاق سواء فى الجرى الطويل والرياضة الغير معتدلة أو فى تنافس النظار فى النتائج السنوية بأضافة الحصص الأضافية ومغالاة المدرسين فى الواجبات المنزلية واندفاع التلميذ لتأدية ما عليه مدفوعا لعوامل شتى لا يسعه معها الالتفات لأى شيء دونها.

أن ما يقع تحت عينى من المشاهدات المؤلمة فى أوائل فصل الصيف من كل عام « وهو فصل الاستعداد للامتحانات » كثير جداً. وكانت آخر مشاهدة من هذا النوع تلميذاً فى الحادية عشرة من عمره كان يستعد لامتحان الابتدائية وقد خصص له ناظر المدرسة ولزملائه التلاميذ حصة اضافية فى السابعة صباحا وحصة أخرى فى نهاية يومه المدرسى كانت نتيجتهما بعد عشرة أيام حافلة بالكد لا سيما وان حجرة فصله لم تكن مستوفاة للشروط الصحية من حيث بنائها وتوفر اشعة الشمس فيها، أن مرض هذا المكد البائس بحركة حمية تشبه الانفلونزا وفى الواقع هى انذار عن ضعف الجهاز الصدرى وربما ستتكرر وفى كل مرة تتخلف عادة أثر سيء فى صدره.

والمشاهدة الثانية تقع فى مدرسة من كبريات المدارس الافرنجية فى شارع ضيق فى القاهرة

وكان المكتب البائس يعمل لدخول أحدى الامتحانات الدراسية الثانوية مع ارهاق فى الحصص الاضافية فى جو حجرته الرطب أذ دكت أرضها بالاسفلت الذى يعطى الجسم مع طيلة الجلوس ساعات متوالية استعدادا للنزلات الشعبية وغيرها فكانت النتيجة لهذا الاجهاد سعالا مصحوبا ببصاق ضارب للحمرة .

هذان المثلان هما بعض من أمثلة كثيرة لا تدخل تحت حصر خصوصا وفى غالب الاحيان لا يظهر تأثير هذا الاجهاد الا آجلا .

والوقاية من هـــذه التأثيرات السيئة انشئت فى فرنسا معاهد مخصوصة تمر سياراتها يوميا بالمدارس فتأخذ منها الضعفاء من التلاميذ فى وقت فراغهم المدرسى وهناك حيث جهزت هـــذه المعاهد باجهزة عظيمة من الاشعة فوق البنفسجية تعرض اجسامهم لها بمقادير مناسبة حسب ما يشير بها الطبيب المختص فى هذا النوع من العلاج وقاية من مرض السل . وقد وافق على هـــذه الطريقة المؤتمر الدولى للاشعة الضوئية الذى انعقد فى الدانيمرك سنة ١٩٣٢ والذى اتيحت لى فرصة الاشتراك فى عضويته ، على أن تعم فى سائر البلاد . ولا كانت الألعاب السويدية أو كرة القدم أو حمل الأثقال لتمنع ضعف الصدر الذى تسببه طيلة الجلوس الى المكتب والانكباب على المطالعة . هناك حركات رياضية كثيرة قد سبقنا اليها اليابانيون ، نذكر على سبيل المثال منها تمرينات الدكتور ماها كى التى تقوى الصدر وتمدد الخلايا فى الرئتين جميعاً فيزول اى ركود طارىء فى قمتها قد يعرضها لخطر العدوى مستقبلا .

ولما دلت التجارب والابحاث فى الاونة الاخيرة على أن الكثير من الاصحاء شكلا والذين لا يشكون بتاتا من أى سعال قد يحملون فى لعابهم ميكروب هذا الداء الخبيث (العلامة برنارد ورزت فى باريس) لهذا اصبح من اخطر الامور السكوت على نظام الحفليات والقال سواء فى

المدارس أو غيرها ثم أن الطلبة ما زالوا يرهقون بالمسابقات الرياضية وبمسافات الجرى الطويلة وغيرها من الرياضة الغير مجدية أذ تضيع فائدتها فى الاجهاد والتعب وقـــد شرحنا ذلك تحت « الاسباب المثيرة للعدوى »

تأثير وضع مبانى المدرسة على صحة التلاميذ :

اذا ذكرنا نمو الطلبة وجب علينا ذكر الهواء والشمس واذا استعرضنا منازل المدن والتصاق الشوارع بعضها ببعض وجدنا أن ما تدخله الشمس منها صباحا لا تدخله بعد الظهر واذا عـددنا المنازل التى تدخلها الاشعة مرة واحدة فى النهار وجدنا أن نسبتها لا تبلغ الثلث أما الثلثان الآخران فلمس حوائطها أو تمر عليها مر الكرام لهذا اذا أردنا أن ننشىء طلبه أقوياء البنيه أو جيلا قويا بعيداً عن العدوى وجب علينا أن نعوض عليهم الشمس والهواء اللازمين لنموهم ولاعطائهم المناعة الضرورية لمقاومة الامراض عامه وامراض الصدر خاصة ، فى المدارس أى فى حجرات الدرس وليس فقط فى حوش المدرسة الذى لا يمضى فيه التلميـــذ اكثر من ½ الوقت اليومى . نقول حجرات الدرس وضروره دخول الشمس فيها فى الشروق والغروب على السواء مع تخلل الأهوية الشمالية أو الغربية فى كل الغرف معا وهذا لا يتأتى الا بالوضع الهندسى الذى نصح به العلامة الدكتور روليه وأخذت به اللجنة الدولية الدائمة لبناء المدارس والمصحات فى لوزان بسويسرا وسكرتيرها العام الاستاذ روزليه وقد كانت من نتائج اعمال المؤتمر الدولى الثانى للضوء وقد كونت لقد بارشاداتها أى حكومة عن طيبة خاطر .

وفى هـــذا تقول اللجنة أن محور بناء أى مدرسة أو مصحة لا يجب أن يكون موازيا لمحور الشمال والجنوب كما هو فى رسم البناء المبين فى الشكل بل يجب أن يميل على هذا المحور نحو ثلاثين

درجة أو أكثر حتى يتاح لسائر الغرف فى المدرسة التمتع بالهواء الكافى أنّى كان أتجاهه وعلى الوجه الأكمل فى كافة فصول السنة .



« فى الشكل الايمن الوضع الامثل لبناء المدرسة وفى الايسر الوضع الخاطئ له »

وللمنفعة العامة تتوخى زيادة الايضاح فنقول اننا اذا تخيلنا بنـــاء أحسن مدرسة كما هو فى الشكل ولا نعتقد أن هناك الكثير مثل هذا الشكل بحيث كانت الغرف خالية من جهتين على الاقل مثلا ـــ فى هذا الوضع الخطأ الذى اضاع عليها ٢/٣ قيمتها هو وضع محور البناء فيه مواز لمحور الشمال والجنوب فاذا تخيلناه الآن كما فى الشكل (ب) بطرف البناء الجنوبى وقد انقلب الى أعلى أى الى الشمال مع ميل محور البناء الى ٢٢٥ درجة لاصبحت قيمة البناء اضعاف اضعافهـــا . فى الشكل ب تستفيد كل الغرف قاطبة من الشمس عند شروقها أو غروبها وفيه يتمتع الطالب فى سائر الغرف بالنسيم الآتى من الشمال أو الغرب أو الشرق على السواء وتجوب فيه الاهوية مهما كان اتجاهاتها ولذا لا يشعر بالقيظ أو ارتفاع حرارة الجو صيفا وتصبح كل غرفة كأنها مصح

قائم بـــذاته .

نقول اذا عممت المدارس بهذا الشكل وعلى أساس هذا الفن الهندسى فأننا نوفر على الحكومة الملايين فى بناء المصحات وعلاج مرضى السل .

حركات تقوية الصدر

يشترط فيها أن يكون الشخص طليق الحرارة وأن يكون خاليا من أى ألم فى صدره

(ا) قف أمام نافذتك ولو مرة كل يوم وثبت ذراعيك بجانب الفخذين مع فتح يديك ثم أغلق فمك وتنفس من أنفك تنفساً عميقاً مع ملاحظة أرجاع كتفيك الى الخلف بقدر استطاعتك حتى تشعر بدخول الهواء الى قمتى الرئتين .

(ب) أحجز الهواء داخل الصدر بضع ثوان وانت مثبت ذراعيك فى نفس الوضع الاول بجانب الفخذين .

(ح) أخرج الهواء فى عملية الزفير من صدرك ويديك فى نفس الوضع على فخذيك أما كتفاك فحركهما الى الامام حتى تخرج آخر نفسك من الرئتين وتشعر بأنه لم يبق فيهما هواء بتاتاً . داوم على هذه الحركة مرة الى اثنتين فى اليوم اما اذا كنت تحس ببعض الاجهاد بعدها فيجب عملها كل يومين مرة واحدة حتى تتعود عليها ولا تحس بأى تعب بعدها وحينئذ تزاد الى مرة أو اثنتين فى اليوم وهـــذه الحركة تقوى قمة الرئتين التى يختارها المرض عادة بسبب ضعف حركتها وركود الدورة

الدموية فيها ولذلك يجد الميكروب سبيلا ليرسخ قدميه مع هذا الركود فى هذه الناحية من الرئة ـ أما اذا تقوت الدورة الدموية بفعل هذه التمرينات فقلما يجد الميكروب سبيلا للاصابة .

ولا يجب المغالاة بهذه التمرينات واشدد مرة أخرى فأقول بأن مرة واحـــدة يوميا تكفى لتقوية الرئتين .



حركة الصدر فى الشهيق



حركة الصدر فى الزفير

كيف يمكن للاطباء منع السل الرئوى

أن مرض السل قبل أن يصيب الرئتين تظهر له عـــلامات على حامل الميكروب واضحة للطبيب سواء الطبيب المتفرغ للصدر أو الباطنى الحاذق فاذا ما عالجهـــا فى حينه منع المرض عن الرئتين .

وهذه العلامات هى علامات السل وهو فى الغدد المجاورة للشعب الرئيسية أو للقصبة الهوائية وهذه الحالة تستمر وقتا لا بأس به يتراوح من شهر الى ٦ شهور فيها يفرز الميكروب سمومه فى المريض فاذا ما تركت وشأنها أو اذا أخطأ الطبيب تفسيرها ونسبها الى أسباب أخرى فان المرض يسرى الى الانسجة الليمفاوية المحيطة بفروع القصبة الهوائية أو الى الانسجة الرخوة المحيطة بالغدد نفسها ثم بعد حين يسرى الى الرئة نفسها .

والمرض فى هاتين الحالتين يأخـــذ وقتا غير قصير ولكل حالة علامات مميزة يجب الاطباء الالمام بها تمام الالمام حتى يساعدوا فى منع المرض من الوصول الى الرئة . فان علاجهما من أسهل الأمور .

الأعراض : يشعر المريض بتوعك لا يعرف سببه مع ارتفـــاع بسيط فى درجة الحرارة بثلاثة ٣ ر ٣٧ أو ٥ ر ٣٧ وألم فى ناحية من مقدم الصدر أو بين عظام اللوحين فى الخلف أو أن يكون الألم معدوما ويشعر المريض بضغط أو ثقل فى القص الصدرى لا عـــلاقة له بالمشى أو الحركة كالعارض الذى يشاهد فى الالم القلبى والذبحة الصدرية وفى هذه الحالة يأتى المريض فيقول لنا بأنه يشعر بثقل فى التنفس ولا يمكنه أخذ نفسه بسهولة أو أن يقول لنا بأن هناك ضغط مثل

ثقل الرحى على مقدم صدره لا يزيد مع الحركة ولا يقل مع الوقوف أو الجلوس أو الراحة .

أو أن يقول لنا بأن هناك ألم فى جنبه على أسفل الضلوع وهذه العلامة لا توجد الا اذا سرى المرض من الغدد الى الانسجة الليمفاوية المحيطة بفروع القصبة الهوائية ووصل الى البلورا .

وفى معظم الاحيان لا يوجد أى سعال أو بلغم يشكو منهما المريض .

اما فى احوال قليلة أى نحو ١٥ — ٢٠ ٪ يشكو المريض من بعض السعال والبلغم المخاطى البسيط أى أن الميكروب يكون معدوما بتاتاً والبصاق غالبا سلبياً — وفى نحو ١٠ ٪ من هذه الحالات يصاحب السعال بصاق مدمم .

علامات الاشعة : (ا) يظهر ظل صرة الرئة فى الناحيتين أو احداهما اكبر من الطبيعى (ب) يظهر أزدياد فى ظل الشعب خصوصا العليا فأن أزدياد ظل الشعب العليا هو علامة صريحة على سريان الميكروب فى الأوعية الليمفاوية المحيطة بالشعب .

وعلاج هاتين الحالتين :

أولا : اعطاء المريض راحة من همله اسبوعا أو اثنين أو اكثر حسبما يتراءى للطبيب .

ثانيا : التشديد عليه بالراحة والنوم لمدة ساعة أو اثنين بعد الغذاء كذلك التشديد عليه بالنوم المبكر فى تمام الساعة ٩ أو الثامنة والنصف على الأكثر لمدة ٦ شهور ويستحسن الدوام على هذا الاسلوب من النوم المبكر حتى يسترد المريض قوته ونشاطه الأولين .

ثالثا : تحاشى الركض والمشى ما أمكن .

رابعاً : اعطاء المريض اشعة فوق البنفسجية مره أو اثنين فى الاسبوع لمدة ٦ دقائق الى ٨ فى

كل مره وحقن الدينافون أو البيوكالسيوم المكونة من مشتقات الكولين. وكذا حقن الجسير الوريدة ممزوجة ببعض الكافور المائى

خامسا : مستحلب زيت السمك الجيرى بالفم مع اقراص الكلسيوم والفيتامين D لمدة زمنية تختلف من شهرين الى ثلاثة ثم يعاد الكشف مرة أخرى ويكرر العلاج اذا لزم الأمر . ولسهولة معرفة هذه الحالات فى وقتها ودرء انتشار المرض عن الرئة يجب فحص الافراد فحصا دوريا كل ستة أو كل ستة شهور وهذا لا يتأتى الا بسن قانون التأمين الاجبارى ضد السل وسنعود لشرح هذا الموضوع تحت فصل مستقل

مرض البول السكرى

من المعروف الآن أن معظم المصابين بالبول السكرى ينتهى بهم الحال الى الاصابة بالسل الرئوى وان ٦٠ ٪ تنتهى حياتهم بسبب هذا الداء لهذا يجب على الطبيب الكشف على المصابين بالبول السكرى بالاشعة بين حين وآخر سيما اذا شكى أحدهم ببعض السعال المصحوب بألم فى الصدر أو بزكام طويل الأمد حتى اذا وجد تضخم فى حجم غدد الصدر أو فى الظل الشعبى بادر الطبيب الى ايقاف المرض قبل سريانه الى الرئتين .

وأن حسن علاج البول السكرى هو خطوة موفقة فى منع حالات كثيرة من السل الرئوى .

وليلاحظ الطبيب بأنه اذا شكى مريض البول السكرى من زكام طويل أو التهاب فى الحنجرة أو سعال جاف متكرر أو ارتفاع قليل فى الحرارة فليعط هذه الاعراض قسطا كبيرا من العناية لأنها قد تكون بوادر المرض الكامن وأن هذه العناية فى حينها توفر حياة المريض لأن تطبيق الرئة فى الوقت المناسب سواء لأحدى الرئتين أو للاثنتين هو أحسن علاج .

الرئة اليمنى فى حالة تطبيق تام

الاعراض الاحتقانيه للمركبات الحديديه

(ولذا يجب الحذر فى وصفها)

أن الأدوية التى تحتوى على الحديد كثيرة الاستعمال منتشرة بين الجمهور ولما كان استعمالها يحسن الهيموجلوبين والكرات الحمراء فى الدم وعلى ذلك يشعر المريض ببعض النشاط والقوة الا أن هذه النتيجة لها نتيجة عكسة لاحقة تظهر بعد شهر أو ستة شهور أو أكثر وسببها أعراض احتقانية على الغدد الشعيبة أو فى صرة الرئة أو فى الأصابات المتكلسة القديمة فى الرئة . وأول علامة لهذه الاحتقانات أما ارتفاع فى الحرارة كالحمى الدرنية الشبيهة بالتيفودية أو بدء هزال وضعف الشهية أو بعض البلغم فى القصبة الهوائية يحس به المريض يميل الى تسليك حنجرته من وقت لآخر ويعتقد أن هناك مبادىء برد فى الزور - ولكن اكثر الاعراض حصولا هو نزيف أو بصاق مدمم ويعزو المريض هذه الاعراض لاسباب طارئة أخرى كما أن الطبيب لا يهتم بسؤال المريض عن الظروف أو الأدوية التى اثارت هذه الاعراض ويبتدىء بعلاج المريض ولذلك يسمر السبب مجهولا عن المرضى وعن الاطباء على السواء .

أما كيف يؤثر الحديد على الصدر الضعيف فهو كما يأتي :-

أن الصدر الطبيعى ينفرج فى أثناء الشهيق أكثر من الصدر الضعيف المعرض للعدوى وهو كما نوهنا يكون مستطيلا أم ضيقاً أو أن يكون منكمشا نوعا الى الوراء بسبب الانسجة الليفية المنتشرة فى صرة الرئتين فيظهر كانه مسطحاً بدلا من أن يكون مستديراً - ويكون الشخص مشعرا أكثر من المعتاد أو يكون شعر جسمه متزايداً فى عموم مسطحه .

وسبب عدم انفراج الرئتين فى الصدر المعرض عن الصدر الطبيعى راجع لكثرة الخلايا

الليفية حول الأوعية الليمفاوية والغدد الشعبية وصرة الرئتين - وعلى ذلك تكون الرئتين باستمرار فى حالة مقاربة لحالتها فى الزفير وتكون الدورة الدموية فى الحويصلات الرئوية فى حالة ركود نوعا - وهـــذا يرجع لسببين أولا عدم انفراج الرئتين للدرجة الطبيعية وثانيا لتأثير السموم على عضلات القلب مما يسبب ضعف الدورة عامة .



فى الشكل ٢ الحويصلات الرئوية فى حالة طبيعية وانفراجها يساعد على الحركة الدموية وزوال أى ركود طارىء — أما فى الشكل الاول فان سماكة البلورا تمنع انفراج الحويصلات تماما وهذا يسبب ركود الدورة وترى الاوعية الدموية الصغيرة ممتلئة بالدم

فعند ما يتناول الشخص بعض المركبات الحديدية فأن كرات الدم الحمراء تزيد فى الدم وهذه بدورها تزيد فى درجة تخثرة وعلى ذلك يصبح سريان الدم فى الاوعية الشعرية الصغيرة حول الحويصلات الرئوية وهى فى حالة ركود سابق متأثرا بسببين أولا الركود السابق وكذا السبب الحاصل من زيادة الكرات الحمراء وزيادة تخثر الدم وهكذا يحصل الاحتقان فى بعض اجزاء الرئة غالبا حول بؤرة متكلسة أو عدد قديمة كامنة . او قرب البلورا المتليفة

ولما كان الباسيل الدرنى عند حصول الاحتقان يفقد غلافة الشمعى ويتحول الى الشكل السيحى المتفرق أو الحبيبى أو وراء الميسروسكوبى وهذه الأشكال تسرى الدورة الدموية بسرعة وتسبب كما ذكرنا الهزال والحمى ثم الاستقرار فى الرئة على شكل التهابى حاد ! ! فلهذا يسهل فهم الأعراض الاحتقانية الخطره التى يتعرض لها المريض من تعاطى المركبات الحديدية من نفسه أو اذا وصفها له الطبيب دون أن يكشف عليه ويعرف من شكل صدره ومن العلامات المميزة المشروحة سابقا استعداد هذا الشخص للعدوى .

ويستسهل الأطباء عادة المركبات الحديدية أو الحقن الحديدية أو الفيتامينات المخلوطة بعنصر الحديد والمنجنيز وهذه كثيرة الانتشار ويمكن أن نشبهها فى وقتنا الحاضر باللعب فى النار .

أن الحوادث التى تقع تحت عينى من هذه الاخطار لا يمكن حصرها ولكنى من باب الأمثلة اذكر

أولا : شخص كان فى دور النقاهة من ارتشاح فى البلورا عولج دون أن يبذل السائل بالراحة والحقن الجيرية ومستحلب زيت السمك الجيرى وبعض منبهات الدورة الدموية مثل نقط بروكاردين والكورامين وكان متمتعا بصحة لا بأس بها - عاودته الشهوة وزالت منه الآلام

الصدرية واصبحت حرارته طبيعية ولكن لسوء حظه رآه أحد اصدقائه الاطباء فوصف له أحد الأدوية المقوية التي تحتوى على عنصر الحديد .... فما كان إلا أن انتكس المريض بعد مضى ٢٠ يوما من استعمال هذا الدواء وارتفعت الحرارة شديدا وأصابه نوع مقلق من السعال ثم بصق دما وكان سببه احتقان والتهاب سريع فى الرئة وقد علمت ان حالته تطورت بعد ذلك من سيء الى أسوأ

ثانيا : آنسة كانت تشكو من حركة حميه بين ٣٧ر٥ - ٣٨ وكانت تشكو من علامات الضعف وصف لها أحد الزملاء حقنا تحتوى على سترات الحديد الخضراء ولم تكن تسعل بتاتا وبمجرد أخذها بضعة حقن منها أصيبت الآنسة بسعال وبصاق مدمم وساءت حالتها فعملت صورة بالأشعة لصدرها ووجدت كلتا الرئتين مصابتين كهف صغير بحجم اللوزة الصغيرة فى الرئة اليمنى وآخر أكبر منه ومحاط بارتشاح قليل فى الرئة اليسرى وقد دعيت مع غيرى من أطباء الصدر للاستشارة فقررنا عمل تطبيق للرئتين

ثالثاً : رياضى متفانى أحس بالضعف فوصف له أحد الصيادلة مركب يحتوى على عنصر الحديد وجميع الفيتامينات معاً وهذه العلاجات هى شائعة كثيرا بالنسبة لأنها من العلاجات المودة ولذلك حضر الىّ بعد شهرين من استعمال الدواء لألم فى قمة الرئة اليمنى يحس به مع التنفس العميق ولم يكن يحس بأى ألم قبل استعمال هذا الدواء وبالكشف على الرئة بالأشعة وجدت صورتها متضخمة فوضع على العلاج الضرورى وشفى بعد ٢٠ يوما — وهذا الشخص لو لم يبادر للعلاج لتطورت حالته الى تكهف الرئة اليمنى أو الارتشاح الدرنى فيها كما حصل فى الحالة السابقة

رابعاً - مدرس سبق أن عالجته من عشر سنوات لارتشاح بلوراوى (بدون بزل طبعاً) وقد شفى تماما وبعد عشر سنوات من شفائه استعمل علاج المودة مأخوذا بكثرة الفيتامينات

المحتوى عليها وكان أنه بعد شهر من استعمال هذا المركب العظيم أحس بحركة حمية وألم فى الصدر وبالنسبة لكونى قد حذرته سابقا من استعمال المركبات الحديدية فى نصائحى التى تعودت أن أعطيها لكل مريض بعد شفائه تنبه وتذكر نصيحتى فرمى هذا المركب وأسرع لركوب القطار قاصدا من محل عمله لاستشارتى وكان أن عولج خمسة عشر يوما فعادت حالته طبيعية وتعودت عليه بالاستمرار على أقراص الكلسيوم المحتوية على فيتامين و بكمية معتدلة ٥٠٠ وحده فى كل قرص خوفا من النكسة

والاشخاص الذين يجب الحذر فى اعطائهم المركبات الحديدية هم :

الصدور الطويلة أو المفرطحة . أوالصدر المستدير إذا لاحظ الطبيب بالسماع فى أحد جانبيه نقص فى سماع الاصوات التنفسية كما يحصل عادة عند وجود التصاق قديم فى البلورا أو سماكة فيها أو خشونة فى صوت الزفير فى أى مكان من الرئة ـ أو كان صوت الزفير أطول من المعتاد

أو إذا شكى المريض فقط من آلام صدرية فى مقدم الرئتين أو ارتفاع بسيط فى حرارة تحت الابط مما يدل على حصول تضخم فى الغدد التى يمكن التأكد منها بواسطة الأشعة X ـ وهنا الخطر كل الخطر فى استعمال الحديد الذى يثير هذه الغدد ويجعل المرض ينتشر منها الى ما حولها من الرئة أو الى الرئة الثانية

وبقيتنا أنه يمكن الاستغناء عن المركبات الحديدية : أولا : بمعرفة سبب فقر الدم الناشىء من وجود بؤرة فى الاسنان أو امتصاص سموم ركود حركة الامعاء أو امتصاص بؤرة فى الغدد أو ملاريا قديمة وبازالة هذه البؤر يزول فقر الدم ـ ثانيا ـ يستعاض عن هذه المركبات الخطرة بأملاح الفسفور أو فوسفات الجير أو حمض الفوسفوريك المخفف وحده أو

مضافا الى الجبر وهذه تساعد على امتصاص البؤر القديمة وتكلسها فتنعدم سمومها ويتحسن لون المريض وقواه

التأمين الاجبارى ضد مرض السل

ان التشريع الخاص بالتأمين الاجبارى ضد مرض السل لهو أمضى سلاح للوقاية من أخطار المرض فى القطر المصرى واحسن وسيلة تصونه من ويلاته ولمنع كثرة الوفيات التى تبلغ عشرين الفاً سنوياً فى القطر من بين ما يقرب من مئتى الف مريض ينشرون سموم العدوى بين غيرهم من السكان حسبما يقدرّه السير روبرت فيليس أحد الثقاة العالمين فى هذا المرض من أن كل وفاة يقابلها ١٠ من المرضى الاحياء

ويتكون العمل الوقائى فى هذا التشريع أولا : يسهل الكشف الدورى الاجبارى من ملاحظة الصدور الضعيفة والمعرضة للعدوى فتعطى النصائح اللازمة أو الأشعة الكيماوية المقوية (فوق البنفسجية) أو الحقن الجيرية الضرورية الخ .... مما يراه الطبيب المختص أو يرسل لدور النقاهة والاستشفاء فى أماكن صحية مقاربة للبحار حيث يمضى الشخص المؤمن فترة للترويح والابتعاد عن العمل وتبديل الهواء وفى هذا وقاية له من غائلة المرض

ثانيا : يسهل الكشف الدورى بالأشعة على من يشك فيه الطبيب لاكتشاف الحالات البسيطة فى أولها واعطائها العلاج الناجع فى حينه فيدرأ عنها انتشار المرض فى الرئه ويوفر حياة المريض بعلاج قصير لا يكلف شيئا

ثالثا : اكتشاف المريض فى أول اصابته زيادة عن أنه يؤدى لسرعة علاجه فى المصحة فهو يسهل فصل المريض عن مخالطيه فيوفر الوقاية لعائلته ومخالطيه

رابعا — ولما كانت مقاومة هذا المرض تتلخص فى توفير الاسرة الكافية فى المصحات لعلاج المرضى وتوفير اسباب الطمأنينة والمعيشة لعائلاتهم اذا انقطع مورد رزقهم سواء بانقطاع عائلهم عن العمل بسبب العلاج المصحى او لامر الوفاة ، وكذا ضمان وقايتهم من العدوى بتوفير المصحات الوقائية ودور النقاهة ومحطات الاصطياف لارسال كل ضعيف منهم للاستشفاء فيها ، لهذا كان لزاما علينا توفير المال الكافى ليكفل للحكومة الصرف فى هذه الابواب لاسيما اهمها وهو ايجاد اكبر عدد من المصحات لتسع اكبر عدد من هؤلاء المرضى ولما كان الواحد منهم يستغرق علاجه المصحى بين ثلاثة وستة أشهر فى الغالب يمكننا ان نقدر عدد الأسرة الذى نحتاجه لعلاج المرضى الموجودين فى القطر اذا لوحظ ان السرير الوحد يكفى لعلاج مريضين أو ثلاثه فى السنة نحو ٧٠٠٠ سرير وهو اقل ما يمكن البحث فى ايجاده فى المصحات التى يجب تشييدها لعلاج المرضى فى القطر المصرى دخول اشعة الشمس الى غرف المصحة جميعها على السواء فى الصباح عند الشروق وفى المساء عند الغروب ومن توفر الهواء لكل غرفة ايضا مهما كان اتجاهه . وهذا النظام من شأنه ان يجعل كل غرفة مصحة قائمة بذاتها . وهو ما اتفق عليه المؤتمر الدولى الثانى للاشعة الضوئية عام ١٩٣٢ ودارت ابحاثه على علاج السل بالأشعة الضوئيه وقد كان لى حظ اشتراك فى عضويته من القطر المصرى فكما ان المصحات هى العلاج ضد السل كذلك الاشعة الضوئيه هى عماد العلاج المصحى وعليها ترتكز اعمال المصحات وقائية كانت او علاجية

وهنا نذكر على سبيل المثال لندل على فضل المصحات ان ضحايا هذا المرض بلغوا نحواً من ٧٠٠٠٠ وفاة سنويا فى ايطاليا من ١٠ سنوات فقلت الآن نحو النصف بعد الاكثار من اسرة العلاج فى اعظم مصحات رايتها فى القارة الاوربية . وهذا اثر من آثار قانون التأمين الاجبارى ضد السل وهو مدار بحثنا والذى سنته الحكومة الايطالية عام ١٩٢٧ .

فقانون التأمين الاجبارى ضد مرض السل يضمن العلاج للمرضى مهما طالت مدته وقد تبلغ فى بعض الاحيان سنتين أو اكثر فلا يسمح بخروج احدهم الا بعد التيقن من الشفاء فيرد المريض للهيئة الاجتماعية صحيحا يمكنه العودة لاعماله من دون ضرر يلحق به أو يلحق بمن يختلط بهم .

والقانون يكفل لعائلة المرضى وكذا الضعفاء من السكان والذين يظهر لهم الاشتباه سواء من عائلاتهم أو من غيرهم الوقاية من غائلة هذا المرض بتوفير المصحات الوقائية وكذا دور النقاهة ومحطات الاصطياف أو المستعمرات الخلوية .

والقانون يخول لعائلة المريض أو المستشفى أو المصطاف أن يتناول معاشا يوميا بناء على رغبته طبعا ومهما طال زمن علاجه لتستعين به على معيشتها فيدفع لعائلة العامل المريض مثلا ما تتفاوت قيمته بين ثمانية قروش الى عشرين قرشا وهذا المبلغ يدفع ايضا حتى ولو كانت المعالجة مجانية فى منزل العامل زيادة على ما يصرف له من الادوية والعقاقير .

والقانون له مزايا منها أن التأمين يشمل العائلة : اى زوجة المؤمن عليه او الزوج أو الاولاد الشرعيين أو الاخوة أو الاخوات المقيمات مع المؤمن عليه وكان سنهم أو سنهن اقل من ١٥ عاما .

ولا يحق للفرد ان يتمتع بحقوق وامتيازات التأمين الا اذا سدد على الاقل ١٢ قسطا شهريا

قبل تقديم طلبه للحصول على فوائد التأمين التى تشمل اما وضعه فى احدى المصحات أو معاهد الاستشفاء او الاصطياف . أو وضع احد ابنائه أو اهله فى المعاهد الوقائية أو وضعه تحت المعالجة المنزلية اذا شاء .

الاقساط الشهرية — تدفع هذه الاقساط بالكيفية الآتية : ان العامل الذى يتقاضى اجرا يوميا اقل من ٨ قروش يدفع قسطا مقداره قرش فى الشهر ويدفع نفس القيمة صاحب العمل الذى يخدم عنده العامل . والعامل الذى يتناول اجرا اكثر من ٨ قروش يوميا يدفع قرشين شهريا يدفع مثلها مخدومه . واما عمال الفلاحة فى العزب وغيرها فيدفعون قسطا يوميا يبلغ مليما واحداً أو خمسة مليمات كل اسبوعين وقرشا واحدا شهريا ، وهكذا تزداد القسمة بزيادة مقدار ما يكسبه المؤمن عليه .

والقانون يضم تحت لوائه العمال الذين يكسبون اقل من ٨٠٠ قرش شهريا وكذلك الفلاحين وصغار الملاك والمستأجرين والمعلمين فى المدارس الاولية والابتدائية والخدمة والباعة المتجولين وغيرهم من فئات الطبقة الصغيرة .

وتتولى التأمين مصلحة حكومية او ما يسمى بصندوق التأمين تتعهده الرقابة الحكومية كما هو الحال فى ايطاليا .

والقانون كما انه يهيء المساعدة والعلاج لجميع افراد عائلة المريض اذا ماطرا عليهم المرض فهو يسعى ليتداركها بالفحص الطبى بالأشعة من وقت لآخر وبالنصائح اللازمة سواء بالزائرات الصحيات أو الرقابة المنزلية فى المستوصفات وغيرها من الطرق المذكورة آنفا بمجرد ظهور بوادر الهزال أو أى ضعف مهما كان نوعه ، وعليه يكون القانون أهم أركان الطب الوقائى

للهيئة الاجتماعية

ومن الوجهة الاقتصادية يجد المؤمن عليه اذا مرض المساعدة المادية التى تضمن له دريهماته القليلة التى كان يدفعها مصروف عائلته حتى يعود اليها صحيحا معافى مهما طال أمد علاجه . وبغير هذا القانون يندفع المريض الفقير وراء العمل ويسعى وراء الرزق مكابراً المرض فى سبيل أطفاله وذويه حتى تأتى الساعة التى ينشب فيها المرض أنيابه به ويصبح ولا يرجى له أمل فى الشفاء

إذن فالقانون لا يرمى الى غاية صحية واقتصادية فحسب وانما له غاية انسانية نبيلة لتخفيف آلام وويلات المرض عن الجمهور ، بل يرمى إلى صيانة الافراد وهذا غاية ما تتطلبه الامم وتنشده ألا وهو قوة تعدادها

وفى هذا السبيل سبقت بعض الدول غيرها فجعلت التأمين الاجبارى غير قاصر على مرض السل والشيخوخة فقط كما هو حاصل فى ايطاليا ، بل جعلته شاملا لسائر الامراض فسنت قانون ١٥ يونيو سنة ١٨٨٣ الذى نسجت على منواله بريطانيا العظمى بأن سنت قانون ١٦ ديسمبر سنة ١٩١١ وله أهميته بأنه لا يشمل التأمين ضد جميع الامراض والشيخوخة فقط بل ضد البطالة أيضا وفيه تساهم الحكومة بنصيبها مع صاحب العمل والعامل فى دفع قسط التأمين وهو فى مقداره تافه للغاية . ثم حذت حذو بريطانيا بلدان كثيرة مثل بلجيكا التى سنت قانون أول مايو سنة ١٩١٤ وهو يشبه قانون التأمين البريطانى شبها تاما

ولى رجاء اختتم به كلمتى الصغيرة بان تسن حكومتنا السنية الى جانب القانون سالف الذكر قانون يمنع المصابين بمرض الزهرى من الزواج حيث ثبت من أبحاث عدة من بينها أبحاثى التى

اقوم بها منذ خمسة عشر سنة والتى تقدمت بنتائجها لمؤتمر السل الدولى فى بولانده — ان مرض الزهرى ولو أنه لا يكون جرثومة السل الا أنه يكون التربة الصالحة التى تلائمه وينمو فيها وان هذه التربه تتوارث فى نسل المصابين بهذا المرض (الزهرى) من جيل الى جيـــل ولا تضعف الا بعد أربعة أو خمسة أجيال

وقد أمكننى تتبع علامات الزهرى الورائى فى المصابين بمرض السل بنسبة ٨٦ فى المئه وفى ١٤ فى المئة أمكن تتبع العـلامات بفحص أبويهم او أولادهم أو أخواتهم أو أقاربهم . وهـو ما يسميه علمـــاء الزهرى بالعـــلامات الورائية غير المباشرة وهى تدل بصفة جازمة على تلوث النسل

فمحاربة مرض الزهرى الورائى مع ما ينجم عنه من كثرة المصابين بالعته أو الجنون أو لأمراض العصبية والتشويه الخلقى وغيرها هى فى الواقع جهود تبذل فى سبيل الكفاح ضد السل ايضا وبهـــذين القانونين ارجو ان نكون قد وفقنـــا لحل مشكلة مرض الســـل فى مصر

هـذا ما ارى انه يصبح علاجا للحالة الصحية العامة فى البـــلاد للتخفيف من تاثير هـــذا المرض وقد يدفع عن الطبقة الفقيرة ويلات ومصائب عظيمـــة وكل ما ورد فى هـــذا البيان جاء نتيجة للدرس الذى باشرته اثناء رحـــلاتى الى اوربا للاشـــتراك فى مؤتمراتهـــا الدولية الصحيـــة ونتيجة زياراتى لاكـــبر معاهدهـــا ومستشفياتهـــا وابحـــاثى فيها

وتأمل ان تستمر البلاد فى نهضتها المباركة مشمولة برعاية حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم الذى يمدها بنصائحه السامية ومساعداته الغالية .



« كتاب شكر حضرة صاحب المعالى وزير الشئون الاجتماعية للاوقاف على نحت القانون سالف الذكر »

« نصائح موجزة »

(١) أن بناء الخلايا الجسمية Metapolism لا يتم الا اثناء النوم فاجتهد أن تكسب اكبر قسط من هذا التجديد بتمتعك بأكبر قسط من النوم اى بما لا يقل عن اثنتى عشرة ساعة يومياً واعلم أن النوم المبكر هو أعمق وأحسن وأغزر فائدة بعكس النوم المتأخر فانه يكون متقطعاً وغير عميق وفائدته للجسم اقل ، هذا الجسم الذى يحتاج الى تجديد واصلاح الخلايا التى تكسرت أثناء النهار بعملية كتابولزم .

(٢) أن اكبر سبب من أسباب السل هو السهر المتواصل وكثرة الاجهاد سواء بكثرة العمل أو كثرة اللذات الجسدية ولذا فانه يعرف بمرض السهر . فابتعد عن السهر قدر طاقتك وأرح جسدك ولو ساعة أو اثنتين يومياً بعد الغذاء .

(٣) ابتعد عن الزكام واعلم بان الزكام المزمن دليل على نقص الفيتامينات فى الجسم أو نقص الجير الذى لا يثبت فى الخلايا البشرية الا بمساعدة الفيتامين (د) . لهذا بادر باستشارة طبيبك عند ما يطول معك زمن الزكام ليعمل لك حقن الجير (كالسيوم) المزوجة بالفيتامين أو ليصف لك ما يماثلها بطريق الفم مثل اقراص (كلسيدك) أو حبوب (ابيون) تحضير معامل ايفانس الانجليزية .

(٤) ابتعد ما امكن عن العمل فى الاماكن التى لا تدخلها الشمس واجعل مكان عملك صحياً تتخلله اشعة الشمس ساعتين أو ثلاث ساعات على الاقل يوميا وان كان هذا غير ممكن فاستعض ، على الاقل ، ببعض جلسات الاشعة فوق البنفسجية بمعدل ٦ جلسات كل ستة شهور

أو كل سنة على الأقل . وهذه على قلة عددها تعوض عليك ما فاتك بحرمانك من أشعة الشمس فى محل عملك .

(٥) احرص على أن تتخلل أشعة الشمس غرفة نومك ولو ساعه فى النهار واعلم أن الانسان يمضى نصف حياته موقته فى غرفة نومه فاجعل جوها مشبعا بأشعة الشمس على قدر ما يمكنك .

(٦) خصص خمس دقائق يوميا لاستنشاق الهواء النقى أمام نافذتك بطريق التنفس العميق حتى تشعر بأن الهواء ينتشر فى جميع اجزاء الصدر وبهذه الطريقة يمنع ركود الدورة الدموية فى قمة الرئتين الذى قد يمهد لحصول استتباب عدوى طارئة وتمكنها .

(٧) بادر باستشارة طبيبك لاى سعال يتجاوز شفاؤه عشرة ايام خصوصا اذا كان فى فترة الصيف ، وتمسك بالاستعانة بتصوير الصدر حيث فيه الاطمئنان على حالة الرئتين واكتشاف العلامات الاولى للمرض مثل تضخم بسيط فى الغدد الشعبية أو زيادة فى ظل الشعب سيما اذا كانت فى اجزاء الاعلى من الرئة أو تكهف صغير لا يزيد عن حجم البندقة فهذا لا تراه العين المجردة بالكشف النظرى بالاشعة .

(٨) لا تهمل اصابتك باية بحة فى نغمات الصوت تتجاوز الاسبوعين ، فكثيرا ما تكون انذارا للمرض الذى يسهل جدا علاجه فى أول مرحلته .

(٩) تجنب السكنى فى المنازل العالية الارتفاع كرابع دور مثلا فاكثر الا اذا كان فيها مصعد كهربائى لان السلالم العالية مثل ركوب الدراجات ، من اقوى العوامل فى اضعاف الرئتين كعامل السهر سالف الذكر .

(١٠) تجنب تعاطى الحقن الحديدية أو الحقن المقوية التى يدخل فى تركيبها الحديد خصوصا

اذا كنت فى دور النقاهة من انفلونزا طويلة الامد أو نزلة شعبية مصحوبة بحرارة خفيفة ، أو اذا كنت تشكو من داء الجنب (الباورا) اذ كثيرا ما يكون للحقن الحديدية مضاعفات سيئة على الرئتين تظهر علاماتها آجلا ، ربما بعد شهر أو بعد ٦ شهور . وقد رأيت كثيرا منها تنزف من صدرها بعد الحقن الحديدية .

(١١) لا تبالغ بتعاطى الفيتامينات بكثرة فهذه قد تؤدى الى نتيجة عكسية وهكذا اثبت العلماء أن زيادة جرعات الفيتامين (د) تسبب نقص الجير فى الخلايا وانقاص نسبة فى الدورة الدموية وسرعة افرازه فى البول . وهذا عكس النتيجة المشاهدة بالجرعات الصغيرة والمعتدلة .

(١٢) المعروف أن الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده ، وهذا ينطبق على المبالغة فى التعرض لاشعة الشمس خصوصا قرب البحار أو احواض السباحة المنتشرة فى القاهرة ، فان انعكاس أشعة الشمس بجانب المياه تكسبها قوة فى الاشعة فوق البنفسجية ، وهذه بدورها تفيد الصدر بمقادير صغيرة كما سبق شرحه ، فاذا زاد تعرض الجسم العارى عن ربع ساعة بقربها عملت نفس عمل زيادة الفيتامينات . من خفض نسبة الجير فى الدورة الدموية والخلايا وعملت على افرازها من الغدد المتكلسه والبؤر التى تكون شفيت من زمن بعيد . ولذلك نشاهد حالات الاحتقانات الرئوية أو حركة حمية طويلة أو نزيف صدرى نتيجة للمبالغة فى التعرض للشمس بقرب البحار واحواض السباحة .

(المراجـــع)

المجلد التاسع لمؤتمر الاتحاد الدولى للسل — تطورات ميكروب الدرن للعلامة البولندى الاستاذ كارواشى .

المجلد التاسع لمؤتمر الاتحاد الدولى للسل — ميكروب السل المتجاوز فى الصغر Ultra Virus للاستاذ فالتر

المجلد التاسع لمؤتمر الاتحاد الدولى للسل — الزهرى الورائى وكيف يؤهل لعدوى السل الرئوى للدكتور نجيب أسعـــد

المجلد الثامن عشر للمجلة الطبية المصرية — الخطوات الاولى للسل الرئوى للدكتور نجيب أسعـــد

المجلد العشرون للمجلة الطبية المصرية — علاج السل الرئوى بمركب (الفاندوفين) للدكتور نجيب أسعد

المجلد الثانى والعشرون للمجلة الطبية المصرية — العلاقة الوثيقة بين السل الرئوى والزهرى الورائى للدكتور نجيب اسعد

دائرة المعارف الفرنسية للرئة والبلورا — للاستاذ سرجنت بكلية باريس والدكتور مينيو وآخرين

مؤلف السل الرئوى — للعلامة الانجليزى الاستاذ ونجفيلد

مؤلف السل الرئوى — للاستاذ الفرنسى الدكتور ليون برنارد



حضرة صاحب الفخامة رئيس جمهورية بولانده يترأس المؤتمر التاسع للاتحاد الدولى لمكافحة السل وعلى يمينه حضرات وزراء وعلى يساره حضرات السفراء وقد اشير بسهم الى المؤلف وهو يستعد ليذيع اكتشاف طيب مصر على هيئة المؤتمر .

السطر	الصفحة	الخطأ	الصواب
٣	مقدمه	ولاصلاح	والاصلاح
٩	»	مايكون	مما يكون
١٤	١	النوم وابسرحة	النوم والراحة
٨	٣	ومرتب	ومرتب
١٥	٥	فتاة	فتساة
١٦	٧	يتشرب	يتسرب
٨	٨	تتكش	تتكش
١	٩	يعارض	بعارض
١٤	١١	ثم يندرج	بالتدريج
١٥	١١	فاكش	فاكسين
١٦	١١	غالبسة	غالباً
١٢	١٣	يصب	يصيب
٢	١٦	ليضيعة	لبضعة
١٢	٢٣	وكثير	وكثيرا
١١	٢٩	بلورأدى	بلوراوى
١٢	٣١	فىحينه	فى حينه
٤	٣٤	وبعض منهم	والبعض منه
	٣٤	السل وعلاماته	وعلاماته
٨	٣٦	اما ان يأتى	أما أن يأتى
١٥	٣٧	الغير مسببة	الغير مسببه
١٨	٣٣	التهاب الدرنى	التهاب الدرنى
١٨	٣٣	التهاب السحائى	التهاب السحائى
٩	٣٨	صدرة	صدره
؟	٤١	صحتهم	صحتون
٥	٤٢	مصارمة	مصادمة
١٥	٤٦	فان انسى	فان أنس
٥	٤٧	البلغين	البالغين
؟	٤٩	دور	دورا للوقاية
٦	٥١	غير مستديرة	غير مستدير
٦	٦٥	اصف	اصف
٦	٦٦	وللعمل البسيط	والعمل البسيط
٧	٦٧	حوائط الكف	حوائط الكهف
٦	٦٩	الولاريوم	السولاريوم
٣	٧٠	بجهودا	مجهودا
١٦	٧١	مستحضات	مستحضرات
٦	٧٢	سنكرها	سنذكرها
٦	٧٢	تشكو	يشكو
	٧٤	فرصة زهبية	فرصة ذهبية
١	٧٤	ومستشقاته	مشتقاته
٥	٩٢	الكرات الحراء	الكرات الحمراء

السطر	الصفحة	الخطأ	الصواب	السطر	الصفحة	الخطأ	الصواب
٥	٩٢	نتيجة عكسة	نتيجة عكسية	١٠	٣٦	ما	أما
١٢	٩٢	ولذلك يسمر السبب	ولذلك يستمر السبب	١٣	٣٦	$\frac{٣}{٢٠}$	$\frac{٣}{٢٠}$
٦	٩٠	الاجيارى	الاجبارى	٩	٢٦	يفحص	بفحص
١٥	٨٢	تتخلف	يتخلف		٢٦	غزبر	غزير
١	١٠٤	Metapolism	Metabolism	٢	اكتشافات المؤلف	تـطهر	تظهر
٦	٧٧	مثل	شل	٤	» »	أزاعها	أذاعها
٩	٧٨	هواءة	هوادة	٢	٥	تسمى	يسمى

فهرست المواضيع

صفحة	الموضوع
١	نظرة عامة
٥ ، ٣٧	الزكام
٧	النزلة الشعبية البسيطة
٩	النزلة الشعبية الزلالية
١٩	الالتهاب الشعبي الرئوي
٢١	الانخراب الفصي الرئوي
١٣	الورم الدبداني الرئوي
١٢	تضخم الغدة التيموسية
١٠	تمدد الشعب
١١	السعال الديكي
٢٩	الاحتقان الرئوي
٢٥	العدوى القطارية في الرئتين
٧٥	الانسكاب البلوراوي
	مضاعفة لحقن الهواء
٣٧	حقن السائل البلوراوي للارنب الهندي (الفار الأبيض)
٣٠	أطوارات مكروب السل
٣٢	الشكل المتناهي في الصغر
٣١	الشكل السبحي للجرثومة

صفحة	الموضوع
٣١	الشكل الحبيبي
٣١	الشكل السيانوفيلي
٣٢	الشكل الفطري للجرثومة
٥٠	حمى السل الشبيهة بالتيفود
٥٢ ، ٥١	تشخيصها من التيفود
٥٢	زرع الدم بطريقة لوفنشتاين
٣١	زرع السائل البلوراوي
٥١	الالم الصدري في حمى الدرن
٣٧	الالم الصدري في التهاب البلورا المزمن
٣٨	الالم الصدري كعلامة للسل في أولى خطواته
٥٣	علاج حمى الدرن الشبيهة بالتيفود
٣٤	اعراض السل في أولى خطواته
٢٣	خراج الرئة
٥٤	الاسباب المباشرة لانتقال العدوى
٤٠	الاسباب المثيرة للعدوى
٥٩	الاسباب الغير مباشرة للعدوى
١٤	العدوى التي تسببها الكلاب
٤٤	المبالغة في الأشعة فوق البنفسجية
٨١	المبالغة في الفيتامينات
٤٣	حمامات البحر

صفحة	الموضوع
١٠٦	حمامات السباحة
٢٨	الحمام وخطر تزغيطه
٤١	المبالغة فى الرياضة
٤١	اصابة الرياضيين المحترفين
٤١	اصحاب الحرف الليلية
٤٠،٣	الراحة الجسدية
١٠٥	المساكن العاليه
١	المساكن المتلاصقة
٤٠	السهر
٤٣	الافراط الجنسى
٤١	متاعب التفكر
٦٢	وقاية الرئة عن طريق البلورا
٤٦	السل فى الاطفال
٣٨	علامات السل فى الاظافر
٤٩	وقاية الاطفال
٩٧	وقاية العمال بالتأمين ضد السل
١٠٠	وقاية صغار الموظفين ضد السل
١٠٠،٩٩	ماذا يستفيد المؤمن بدريهماته
٨٦	حركات تقوية الصدر
٨٢	الوقاية فى دور التعليم
٨٤	تأثير وضع مبانى المدرسة على صحة التلاميذ

صفحة	الموضوع
٨٣	معاهد الأشعة المخصصة لتقوية التلاميذ
٨٤	خطر المبالغة فى الرياضة بدور التعليم
٨٢	خطر الحصص الاضافية على الصدر
٧٩	الاشعة فوق البنفسجية للوقاية والعلاج
	الحالات الاولى
٨٠	الصداع مع الأشعة فوق البنفسجية
٨٠	ارتفاع الحرارة مع الاشعة فوق البنفسجية
٦٤	العلاج الجديد وسيلة قوية من وسائل الوقاية
٦٤	المصحات
٦٥	درجات الراحة
٧١	العلاج بالملاح الذهب
٧٢	العلاج بحقن الفاروقين
٧٤	العلاج الجراحى
٧٦	احسن انواع التطبيق
٧٧	ندف عصب الحجاب الحاجز
٧٨	عملية قطع الضلوع
١٠٤	النوم والمينابولزم
١٠٤	النوم ومقداره اليومى
١٠٧	المراجع العلمية
١٠٤	نصائح موجزة
١٠٩	الخطأ والصواب

فهرست الصور

صفحة	
٦	قطاع جانبي للرأس والصدر
١٣	الغدة التيموسية
١٤	عدوى الكلاب
١٥	كيس ديداني في الرئة اليسرى
٢٤	خراج أجر وخراج في زمن التفريغ
٢٧	صدر مصاب بالمرض الفطري
٢٨	أشكال العدوى الفطرية
٣٠	مكروب الدرن
٣٣	تطورات مكروب الدرن
٣٤	مكروب الدرن على اشكال مختلفة
٣٥	بؤرة متكلسة في الرئة
٣٩	القوس الظفري اكتشاف المؤلف
٤٣	حركة التنفس عند الرجل والمرأة
٤٥	احتقان في الرئة اليمنى

صفحة	
٥٤	الالتهاب القصى الدرنى
٥٦	انتقال الميكروب من البصاق الى الماكولات
٥٧	انتقال العدوى من الأم الى رضيعها
٥٨	انتقال العدوى الى باقى افراد العائلة
٥٩	انتقال العدوى بالتنفس والسعال
٦٩	سولاريوم فى احدى المصحات
٧٠	ارتشاح درنى شديد فى صرتى الرئتين
٧٨	كهف كبير والتصاقات
٨٧	حركات تقوية الصدر
٩١	الرئة اليمنى فى حالة تطبيق عام
٩٣	الاعراض الاحتقانية للمركبات الحديدية فى الرئة
١٠٣	كتاب شكر من وزير الشؤن الاجتماعية للمؤلف
١٠٧	صورة لفخامة رئيس جمهورية بولاندا يفتتح المؤتمر التاسع للاتحاد الدولى للسل وقد اشير بسهم الى صورة المؤلف

EVANS TUBERCULIN PATCH TEST.

اختبار ايفانز للتيوبركلين

طريقة سهلة لتشخيص السل بواسطة اختبار جلدى دون استعمال سلاح أو حقنة ويتكون كل اختبار من شريط لاصق صغير ملتصق به ثلاثة مربعات من ورق النشاف واحد مركز بالتيوبركلين البقرى ومرموز اليه (ب) الثانى بسائل مخصوص للمقارنة والثالث مركز بالتبركلين البشرى مرموز له بحرف H وهو مناسب من سن سنتين الى ١٥ سنة.

وتستعمل معامل أيفانز Evans تيوبركلين منقى وقوته ثلاث أضعاف التيوبركلين القياسى

بعد ٢٤ — ٤٨ ساعة ينزع المشمع ويلاحظ فى حالة ايجابية الفحص الذى يدل على أن الطفل يحمل ميكروب السل وجود تفاعل له حدود منتظمة وظاهرة تماما. وهـذا الفحص لا يصحبه ألم أو سخونة أو تفاعل فى موضع الاصابة الرئوية.

معبأ فى أظرف يحتوى كل على اختبار واحد أو عشرة اختبارات.

ZANT EVANS

زيت هو Para - Chlor - Metaxylenol مركب مع زيت السنوبر وزيوت طبيعية قوية التطهير غير سامة حسنة الرائحة. يمكن استعماله فى الجراحة وتطهير الايدى وعند السيدات مطهر مهلبى عظيم. وكذا فى تطهير دورات المياه والمنازل معبأ بزجاجات ١٥٠ و ٣٠٠ جرام وصفائح تحتوى على جالون وﷺ جالون

EVANS PRODUCTS OF PRECISION

مستحضرات ايفانز الطبية الدقيقة

ANEUREX

أنيوركس : فيتامين ب فى حالة نقية لمقاومة ضعف الاعصاب والتهاباتها له أهمية عظمى فى المتابولزم وضرورى للمحافظة على حسن الصحة وباستعماله يتقى الانسان أمراضاً عصبية كثيرة معبأة فى زجاجات ٢٥ قرص يحتوى كل على ١ ملليجرام

» ٣ » » » » » »

علب تحتوى على ٣ حقن كل واحدة ٢٥٠ ملليجراما .

EUBION

ايبون : يحتوى على فيتامين ا ، و الاثنين الحيويين للاطفال والحوامل والمراضع وكذا فى ضعف الصدر والغدد الخنازيرية ويعوض عن عناصر زيت السمك الكريه الرائحة والطعم زجاجات تحتوى على ٥٠ كبسولة تحتوى كل على ٤٥٠٠ وحده من فيتامين (ا) والف وحده دولية من فيتامين (و) .

KALSOLAC

كالسولاك : يحتوى على عناصر الجير والماجنزيم والفيتامين (و) لتقوية الجسم فى فقر الدم والضعف وسوء التغذية . علب تحوى ٣٠ كبسولة

PURGOIDS

بيرجويدز : حبوب ملينة تحتوى على الفنوفتالين والألوين والبلادونا والابكا ملين لطيف هادى مريح ولا يتعود عليه المرء ويمكن للاطفال استعماله كالكبار . تعبئة الزجاجة ١٠٠ أو ٢٥ حبه .

PNEUMOLYSE LETA (ليتا)

بنيمولايز (ليتا)

لامراض الشعب والرئتين

يتركب بنيمولايز Pneumolyse من زيوت عطرية كزيت الأيكليتول والجومينيول والكافور مع سائل الجيا كول مذابه فى زيت الزيتون المتعادل .

وهذه الزيوت تفرز بواسطة خلايا الرئتين وعلى ذلك تكون نتيجتها تأثير مسكن على الغشاء المخاطى الملتهب :—

والتحسن الملموس بعد اعطاء حقن البنيمولايز Pneumolyse يشاهد فى تقليل كمية البلاغم وفى السهولة التى يتخلص منها المريض

وعاجلا يفقد البلغم رائحته الكريهة ويتحول الجامد والضخم منها الى الشكل الرغوى البسيط ويلحظ المريض فى رائحة نفسه الزيوت العطرية بعد ستة ساعات من الحقنة الأولى :

ويوصف : فى النزلة الشعبية الحـــاده . الألتهـــاب الرئوى الشعبى . النزلة الشعبية المزمنة وتمدد الشعب . الربو المزمن . الالتهاب الرئوى فى النزلة الوافده (الانفلونزا) وكذا فى الالتهاب الرئوى عقب العمليات . ويعطى حقنا فى العضل مرة فى اليوم .

معبأ فى صناديق ٦ حقن كل منهـا ٢ سنتى مكعب وكذا فى صناديق ٥٠ حقنة للمستشفيات

الموزعون الوحيدون م. سلفامور وشركاه قسم الأدوية

بالقاهرة : الادارة شارع عدلى باشا رقم ١٣
المستودع . شارع بستان الدكه رقم ١١
ت : ٤١٢٨٢ : ص ب ١٨٣٢ : م ت ٢٨٤٣٥

بالأسكندرية : الأدارة شارع شريف باشا ٢٢
المستودع : شارع قلعة بمباى رقم ٥
ت : ٢١٢٦٢ (١١ خط) ص ب رقم ٣٩٣
م ت رقم ١٩

PRIMASTHMINE
PRESENTATION Ampoules of 3 cc
FORMULA: Ephedrine Hydrochlor. 0.015 Gm.
Adrenaline . . . . . 0.0005 "
Sodium Camphor Sulfonate . . . . 0.10 "
Luminal . . . . . 0.003 "
Bi-distilled sterile water ad. . . . 3 cc
ACTION. The stimulation of the pneumogastric nerve contracts the bronchi and provokes the asthma crisis PRIMASTHMINE, by stimulating the sympathetic fibres neutralizes the action of the pneumogastric and causes relaxion of the spasm.
INDICATIONS: Asthma, Hay fever, Emphysema, Diaphragm spasma, Stimulant of the Sympathetic, Antidyspneic, Cardiac tonic
DIRECTIONS FOR USE: Subcutaneous or intra-muscular injections. 1/2 to 1 ampoule at the time of the crisis.
"PRIMA" LABORATORIES
Scientific Pharmaceutical Products
Sole Distributor
JACQUES M. REINISCH

بريماثين يوقف نوبة الربو

تحضير الفا ALPHA

شراب برومو سيروب Bromosyrup

يحتوى على مادة الكودايين والبروموفورم وصبغة الا كونيت والتولو الخ . . .
يشفى بسرعة السعال الديكى والكحة والنزلات الشعبية .
للبالغين من ملعقة الى ٦ ملاعق قهوة .
للاطفال نصف الجرعة .

حقن بولمينال Pulminal Ampoules

تحتوى على كينين وكافور وبوكاليبتوبل ومنتول وزيت زيتون .
للالتهاب الرئوى الحاد والالتهاب الشعبى الرئوى الحاد — مشفى للجهاز التنفسى .
تحقن فى العضل حقنة أو اثنتين يوميا .

اقراص كودروبس Co, Drops Tablets

تحتوى على كودايين والتولو والعرقسوس وصبغة الا كونيت وصبغة اللوز المر والأنيتول .
مطهر ومخفف لذيذ للسعال سريع التسكين للسعال رضيق الزور يخفف من تهيج اعضاء التنفس
يوصف خصيصا لسعال المدخنين وللسعال الديكى .
قرص واحد يمتص ببطء كل ساعة أو ساعتين .

حقن برونكياز BronchiaSe Ampoules

تحتوى على = بوكاليبتول — كافور وزيت الزيتون .
ضد النزلات الشعبية الحادة والمزمنة — القرح الباشلسية المحلية — السعال الديكى والتهابات الانف
معبأة فى حقن سعة ١ سم ٣ و ٢ سم ٣ للاطفال والكبار .
تحقن حقنة واحدة يوميا فى العضل .

شراب ايبندرين يوديه Eupnedrine Iodee Solution

يحتوى على = يودور البوتاسيوم — كلوريدرات الايفيدرين — كافين نقى — بنزوات
الصود يوم ونقيع قهوة .
ضد الربو — التشنجات الشعبية — زكام التبن والسعال الديكى — الانقباض — مدر للبول
ومقوى لمسالك التنفس .
للبالغين — ملعقة قهوة مع قليل من اللبن أو الماء مرتين أو ثلاث يوميا عند ابتداء الاكل .

شركة الصناعات المصرية للكيمائيات

والعقاقير الطبية بمصر

فيزاميمكس ايكاديل

تحتوى كل حقنه سعتها ٢ سم٣ على المركبات الموجودة فى بذر الخلة والمضادة لتشنج العصل ومعين فيها كمية الفيزامين بمقدار ٠١ و ٠مجم فى كل أمبوله

الأثر الطبى : تستعمل كموسع للاوعية الاكليلية للقلب ـ وفى علاج الذبحه الصدرية وكمضاده للتشنج خصوصا فى حالات تشنج الحالب (الناشئة عن وجود حصوات فى الحالب) وكيس الصفراء ومجاريها .

حقن بولموكاديل ٢ سم٣

تستعمل فى حالات أمراض مجارى التنفس والنزله الشعبيه والانفلوانزا والربو والتهاب الرئه

شراب بولموكاديل للاطفال

يستعمل فى أمراض الجهاز التنفسى ـ النزلات الشعبيه ونوبات السعال الهوائى والكحة المستعصيه والعصبيه

شراب البولموكاديل للكبار

يوصف فى علاج الكحه المستعصيه والنزلات الشعبيه الحادة والمزمنه والتهابات الحنجره

رينوكاديل . نقط للانف

توصف فى علاج التهابات أغشية الانف المخاطيه ـ والرشح والأنفلوانزا

اقراص فلافاكاديل

تستعمل فى حالات الأمراض الناتجة عن ميكروبات الفم والحلق والتهاباتها

SILBE ASTHMA INHALANT

PROMPT AND CONTINUOUS RELIEF

« SILBE » Brand ASTHMA is not a « Patent medicine » but a scientifically compounded and proven Asthma Remedy.

Each of the substances contained in « SILBE » Brand ASTHMA INHALANT has specific healing Properties and are interdependent on each other. They have been collectively tested to Produce the prompt and continuous relief which you will undoubtedly obtain from your first bottle.

The « SILBE » Atomiser

transforms the medicament into a very fine mist by way of Cold vaporisation You know that the finer the mist-the quicker and better will the inhalnt penetrate to the remotest bronchi and the quicker and better will be the result.

The «SILBE» ATOMISER is inexpensivel of great efficiency, can be recommended with confidence, and used with all marketed inhalants.



سيلبي للمالجة الربو بالاستنشاق (راحة سريعة مستديمة)

إن دواء الربو بالاستنشاق « ماركة سيلبي » ليس من الأدوية المسجلة ولكنة علاج للربو مركب بطريقة علمية ومجرب . ويمكن بواسطته الحصول على أحدث النتائج العلاجية التي أسفرت عنها الأبحاث العلمية . ولكل من المواد التي يشتمل عليها هذا الدواء خصائص علاجية معينة لا تستغنى اجداها عن الأخرى باشر عملية البخ والاستنشاق مدة دقيقه او ثلاث مرتين يوما على الأقل .

أقراص البرنكيزان (Bronochisan Tabletis) Silten London

علاج الربو بطريق الفم - يوقف النوبة بعد دقائق قليلة ويمنع حدوث نوبات طارئه بدون فشل ويتكون من أملاح يزيل الجير والتيوفللين والاميدوبيرين والافدرين والاول له خاصة التسكين على الجهاز العصبي السمبتاوي والثاني له سرعة الامتصاص مع تقوية القلب

فينا وشركاه الوكلاء للقطر المصري
١٠ ش زكي بالقاهرة ت ٤٤٢٧٣

٥ ش الكنيسة المارونية
اسكندرية ت ٢٩٣١٩

مستحضرات ركتر (لندن) Gedeon Richter (Gr. Britain) Ltd. LONDON

أقراص كلسيفيتان Calcivitan كل قرص يحتوى على ٥٠ر٠ كلسيوم ، ٦٠٠ وحده من الفيتامينات د	أمبيسيد Ambesid حقن تحتوى على ١٠ ٪ من امنيوبنزين سفانااميد تسع ٥ سم . صناديق ٥٠ حقنة
أقراص أمبيسيد Ambesid كل قرص ٤٠ وكل فى زجاجات تحتوى ٥٠٠ قرص ضد ميكروب السحى والعنقودى والجنوكوك (السيلان) والتهاب الرئة .	كارباسيد Carbaacid يحتوى على فحم طبى مع حمض المعدة و ٢ ٪ فى علب ٥٠ قرصا يمتص الغازات ويساعد فى عملية الهضم .
برهيبار Berhepar خلاصة الكبدة كل حقنة ٢ سم صناديق ٦ حقن كل فى الضعف وفقر الدم .	الوكلاء الوحيدون اخوان حمصى A. N. R. Homsy شارع علوى رقم ٣ بمصر ت ٥١٠٦٦ ، ٥٣٨٢٧ اسكندرية ٥ شارع سعد زغلول ت ٢٥٤٨٨

شركة مصر للمستحضرات الطبيـــة

تليفون ٤٩٥٤ ميدان فاروق ، العباسية ، مصر س . ت : ٣٢٠٤٨

تقوم الشركة بتحضير الأمبولات الطبية والخلاصات والصبغـات والحبوب والاقراص . كما تجهز أيضا المستحضرات الاتيه :—

Calcium Ampoules
Cardial Ampoules & Drops
Cardiamine Ampoules & Drops
Fertone Ampoules
Forrotonine Ampoules
Strychno Ferrotonine Ampoules
Cal V-D (Calcium Vit. D Tabs)
Nasedrine Drops
Saledrine Drops
Pulmomisrine
Shark Liver Oil
Strychno—Vitamin—Fer
Vitamin—Fer
Vitamin Ampoules & Drops.

UNICAP فيتاميات يونيكاب : فيتامين أ ، د ، جـ ، ب ١ ، ب ٢ ، ب ٦ مع الحديد وحمض النيكوتينيك .

The Polyvitamin Treatment

Vits. A, D, C, B, I, B2, B6, Calcium Paniothenate & Niacin Amide

Restores Vitamin balance in dietary regimens of Diabetis Mellitus Gastro intestinal R Cardiovescular diseases, Arthritis, Allergy & obesity.

Supply Vitamins in adequate amounts when these are deficient thus eliminating a series of serions complications.

When Vitamin metabolism speeds the utilisation of Vitamins as in cases of fevers, *Unicaps* regulary replace the vitamin-destruction.

THE UPJOHN COMPANY — KALAMAZOO — MICHIGAN — U. S. A.

THEOPROPANOL « NATIONAL » ثيوبروبانول (تحضير ناسيونال بامريكا)

يحتوى على الثيوفللين: للذبحة الصدرية ومدر للبول وضيق التنفس الناتج من القلب

Theophyllin combined with Isopropanolamine which renders it not only soluble but well tolerated. The compound is perfectly stable.

Theopropanol National acts on the :

a) Kidneys : Powerful diuretic
b) Heart : Coronary Sclerosis Dyspnea of cardiac origin, Angina Pectoris
c) Lungs : Restores normal respiratory rythm-Asthma.

— Supplied in ampoules for I. V. and I. M. inj also in tablets

Liver Ingect. « National » خلاصة الكبده تحضير ناسيونال امريكا

Highly concented injectable Liver Extract containing 10 USP Units (inj) per cc.

Supplied in vials of 10 cc.

Treatment of all forms of Anaemia, arrhosis of the liver, allergic affections, convalescence after general affections, operations etc

THE NATIONAL DRUG COMPANY-PHILADELPHIA-PENSYLVANIA-U.S.A.

For full informations and medical samples apply to the General Agents.
Michael Setton, Sons & Co. Cairo. 71 Azhar st. Phone 48047
Alex. 102 Mosquée Attarine st. Phone 21143